

7. Komplexní čísla

7.1. Komplexní číslo je uspořádaná dvojice reálných čísel. Komplexní číslo $a = (a_1, a_2)$ zpravidla zapisujeme v tzv. **algebraickém tvaru** $a = a_1 + ia_2$, kde i je **imaginární jednotka**, pro kterou platí $i^2 = -1$. Číslo a_1 se nazývá **reálná část** komplexního čísla a a značí se $\operatorname{Re} a$, číslo a_2 se nazývá **imaginární část** komplexního čísla a a značí se $\operatorname{Im} a$. Množinu všech komplexních čísel značíme \mathbf{C} . Z algebraického tvaru komplexního čísla je zřejmé, že reálná čísla jsou speciálním případem čísel komplexních: reálné číslo a ztotožňujeme s komplexním číslem $a + i0$, tj. s komplexním číslem $(a, 0)$. Komplexní číslo, jehož imaginární část je různá od nuly, se nazývá **imaginární** a imaginární číslo tvaru $(0, a)$, kde $a \neq 0$, se nazývá **ryze imaginární**.

7.2. Operace s komplexními čísly. Dvě komplexní čísla jsou si rovna, jsou-li si rovna jako uspořádané dvojice:

$$a_1 + ia_2 = b_1 + ib_2 \iff a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2$$

V množině \mathbf{C} jsou definovány tytéž algebraické operace jako v množině \mathbf{R} , navíc je pak pro každé komplexní číslo definováno číslo komplexně sdružené. Pro libovolná komplexní čísla $a = a_1 + ia_2$, $b = b_1 + ib_2$ jsou tyto operace definovány takto:

- **Součet:**

$$a + b = (a_1 + ia_2) + (b_1 + ib_2) = (a_1 + b_1) + i(a_2 + b_2)$$

- **Rozdíl:**

$$a - b = (a_1 + ia_2) - (b_1 + ib_2) = (a_1 - b_1) + i(a_2 - b_2)$$

- **Součin:**

$$a \cdot b = (a_1 + ia_2) \cdot (b_1 + ib_2) = (a_1b_1 - a_2b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1)$$

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah $i^2 = -1$.

- **Podíl (pro $b \neq 0$):**

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} &= \frac{a_1 + ia_2}{b_1 + ib_2} = \frac{(a_1 + ia_2)(b_1 - ib_2)}{b_1^2 + b_2^2} \\ &= \frac{(a_1b_1 + a_2b_2) + i(a_2b_1 - a_1b_2)}{b_1^2 + b_2^2} \end{aligned}$$

- **Komplexně sdružené číslo:**

$$\bar{a} = \overline{a_1 + ia_2} = a_1 - ia_2$$

- **Absolutní hodnota (modul):**

$$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} = \sqrt{a \cdot \bar{a}}$$


Absolutní hodnota komplexního čísla je tedy nezáporné reálné číslo a $|a| = 0$ právě když $a = 0$.

Pro sčítání a násobení komplexních čísel platí stejný komutativní, asociativní a distributivní zákon jako pro sčítání a násobení reálných čísel. Stejně vlastnosti má i absolutní hodnota. Pro komplexně sdružené číslo platí vztahy:


$$\overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b}, \quad \overline{ab} = \bar{a} \cdot \bar{b}, \quad \overline{\left(\frac{a}{b}\right)} = \frac{\bar{a}}{\bar{b}}$$

Poznámka. Na rozdíl od reálných čísel **komplexní čísla** nejsou uspořádaná a ani je **nelze rozumně uspořádat**, tj. nelze je uspořádat tak, aby se toto uspořádání (vztah nerovnosti) chovalo rozumně vzhledem ke sčítání a násobení.

7.3. Grafické znázornění komplexních čísel. Gaussova rovina. Z definice komplexního čísla plyne, že komplexní číslo $a = a_1 + ia_2$ můžeme graficky znázornit jako bod $[a_1, a_2]$ roviny. Tím je dáno vzájemně jednoznačné zobrazení množiny všech komplexních čísel na množinu všech bodů roviny. **Gaussova rovina** je rovina, v níž takto zobrazujeme komplexní čísla. Reálná čísla se přitom zobrazují na vodorovnou osu a ryze imaginární na svislou. Osa, na níž se zobrazují reálná čísla, se nazývá **reálná osa** a osa, na níž se zobrazují ryze imaginární čísla, se nazývá **imaginární osa**. Je zřejmé, že body přiřazené číslům a , $-a$ jsou symetrické podle počátku (souřadné soustavy) a body a , \bar{a} jsou symetrické podle reálné osy (viz obr. 7.1).



Obr. 7.1



Obr. 7.2

7.4. Goniometrický a exponenciální tvar komplexního čísla. Je-li $a \in \mathbf{C}$, $a \neq 0$, pak

$$a = |a| (\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

kde φ (viz obr. 7.2) je velikost orientovaného úhlu, který svírá průvodič bodu a s polopřímku kladných reálných čísel. Uvedené vyjádření čísla a se nazývá **goniometrický tvar**.

Položíme-li

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi,$$

potom a můžeme zapsat ve tvaru

$$a = |a| e^{i\varphi}$$

Toto vyjádření se nazývá **exponenciální tvar** čísla a .

7.5. Argument komplexního čísla. Číslo φ z 7.4 se nazývá **argument** komplexního čísla a . Množinu všech argumentů čísla a označujeme $\arg a$.

Platí

$$\varphi \in \arg a, \psi \in \mathbf{R} \implies (\psi \in \arg a \iff \psi = \varphi + 2k\pi, \text{ kde } k \in \mathbf{Z}),$$

tj. argument komplexního čísla je určen jednoznačně až na celistvý násobek 2π . Odtud plyne, že množina $\arg a$ obsahuje jedinou hodnotu φ s vlastností $\varphi \in (-\pi, \pi)$; toto φ nazýváme **hlavní hodnotou argumentu** a značíme $\text{Arg } a$. Je pak

$$\arg a = \{\psi; \psi = \text{Arg } a + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$$

Poznámka: V definici hlavní hodnoty argumentu nepanuje všeobecná shoda, a tak místo v intervalu $(-\pi, \pi)$ se $\text{Arg } a$ někdy bere v intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$.

Určení argumentu. Je-li $a = a_1 + ia_2 = |a|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $a \neq 0$, pak

$$\cos \varphi = \frac{a_1}{|a|}, \quad \sin \varphi = \frac{a_2}{|a|}.$$

7.6. Násobení a dělení komplexních čísel v exponenciálním tvaru. Pro násobení a dělení komplexních čísel v exponenciálním tvaru platí formule

$$a = |a| e^{i\varphi}, b = |b| e^{i\psi} \implies \begin{cases} a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot e^{i(\varphi+\psi)} \\ \frac{a}{b} = \frac{|a|}{|b|} e^{i(\varphi-\psi)}, b \neq 0 \end{cases}$$

Z uvedených vzorců je patrný tento geometrický význam násobení komplexních čísel: geometrické zobrazení, které odpovídá násobení komplexním číslem a , je stejnohlelost se středem v počátku a koeficientem $|a|$ složená s otočením o úhel $\text{Arg } a$. Analogickou geometrickou interpretaci má dělení.

7.7. Umocňování a odmocňování komplexních čísel. Ze vzorců pro násobení a dělení komplexních čísel v exponenciálním tvaru ihned plyne

Moivreova věta. Pro každé $\varphi \in \mathbf{R}$ a každé $n \in \mathbf{Z}$ platí:

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi, \quad \text{tj.} \quad (e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi}$$

Obecněji z 7.6 plyne vzorec pro celočíselnou mocninu komplexního čísla:

$$0 \neq a = |a| \cdot e^{i\varphi}, n \in \mathbf{Z} \implies a^n = |a|^n \cdot e^{in\varphi}$$

Je-li n přirozené číslo, pak n -tá **odmocnina** $\sqrt[n]{a}$ z komplexního čísla a je komplexní číslo z definované vztahem

$$z = \sqrt[n]{a} \iff z^n = a$$

Je-li $a \neq 0$, existuje právě n různých hodnot odmocniny $\sqrt[n]{a}$ a tyto hodnoty jsou dány vzorcem

$$a = |a| \cdot e^{i\varphi} \implies \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{|a|} \cdot e^{i(\varphi+2k\pi)/n} = \sqrt[n]{|a|} \cdot \left(\cos \frac{\varphi+2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi+2k\pi}{n} \right), \\ k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Zřejmě je $\sqrt[n]{0} = 0$.

Grafické znázornění n -té odmocniny. Ze vzorce pro n -tou odmocninu plyne, že

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{|a|} \cdot e^{i\varphi/n} \cdot \sqrt[n]{1},$$

kde

$$\sqrt[n]{1} = e^{i \cdot 2k\pi/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Čísla $\sqrt[n]{1}$ tvoří vrcholy pravidelného n -úhelníka vepsaného do kružnice se středem v počátku a poloměrem 1, s jedním vrcholem v bodě $[1, 0]$. Čísla $\sqrt[n]{a}$ tedy tvoří vrcholy pravidelného n -úhelníka, který dostaneme z předchozího otočením o úhel $\frac{\varphi}{n}$ a stejnolehlostí se středem v počátku s koeficientem $\sqrt[n]{|a|}$.

7.8. Řešené příklady

1. V exponenciálním tvaru vyjádřete komplexní čísla:

$$\text{a) } a = 1 + i, \quad \text{b) } b = -1 + i\sqrt{3}.$$

Řešení: Použijeme vzorce z odstavců 7.2, 7.4 a 7.5:

$$\text{a) } |a| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \quad \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \text{tedy } \varphi = \frac{\pi}{4} \implies a = \sqrt{2}e^{i\pi/4}.$$

$$\text{b) } |b| = \sqrt{1+3} = 2, \quad \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos \varphi = \frac{-1}{2}, \quad \text{tedy } \varphi = \frac{2}{3}\pi \implies b = 2e^{i \cdot 2\pi/3}.$$

2. V algebraickém tvaru vyjádřete komplexní čísla:

$$\text{a) } a = 2e^{i\pi/4}, \quad \text{b) } b = 4 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right).$$

Řešení: V případě a) nejprve převedeme exponenciální tvar na goniometrický, další postup je v obou případech stejný a zřejmý:

$$\text{a) } a = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} + i\sqrt{2}.$$

$$\text{b) } a = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = 2\sqrt{3} + 2i.$$

3. Určete, za jakých podmínek je součet dvou komplexních čísel a) číslo reálné, b) číslo ryze imaginární.

Řešení: Jsou-li $a = a_1 + ia_2, b = b_1 + ib_2$ dvě komplexní čísla, potom pro jejich součet $c = c_1 + ic_2$ podle 7.2 platí $c_1 + ic_2 = (a_1 + b_1) + i(a_2 + b_2)$. Odtud plyne:

a) Číslo c je reálné, právě když $a_2 + b_2 = 0$, tj. $b_2 = -a_2$.

b) Číslo c je ryze imaginární, právě když $a_1 + b_1 = 0$, tj. $b_1 = -a_1$.

4. Nechť $a = 1 - 2i, b = 3 + 7i$. Vypočtěte $a + b, a - b, a \cdot b, \frac{a}{b}$.

Řešení: Podle vztahů z odstavce 7.2 je:

$$a + b = (1 + 3) + i(-2 + 7) = 4 + 5i$$

$$a - b = (1 - 3) + i(-2 - 7) = -2 - 9i$$

$$a \cdot b = (1 - i2)(3 + i7) = (3 + 14) + i(-6 + 7) = 17 + i$$

$$\frac{a}{b} = \frac{1 - 2i}{3 + 7i} = \frac{(1 - 2i)(3 - 7i)}{3^2 - (7i)^2} = \frac{3 - 13i + 14i^2}{58} = \frac{-11 - 13i}{58}.$$

5. Určete absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla $a = \frac{3-2i}{1+2i}$.

Řešení: Podle vztahu z 7.2 pro dělení komplexních čísel

$$a = \frac{3-2i}{1+2i} = \frac{(3-2i)(1-2i)}{1+4} = \frac{3-8i+4i^2}{5} = -\frac{1}{5} - \frac{8}{5}i.$$

Podle definice absolutní hodnoty komplexního čísla (viz 7.2) je

$$|a| = \sqrt{\frac{1}{25} + \frac{64}{25}} = \frac{\sqrt{65}}{5}.$$

6. V goniometrickém tvaru vyjádřete komplexní číslo:

$$\text{a) } z = \frac{1}{1+i} + \frac{1}{-1+i},$$

$$\text{b) } z = \frac{a+ib}{(a+b)+(b-a)i}, \quad ab \neq 0, a, b \in \mathbf{R}.$$

Řešení: V obou případech nejprve číslo z vyjádříme v algebraickém tvaru a potom použijeme vztahy z 7.2 a 7.5:

a)

$$z = \frac{1}{1+i} + \frac{1}{-1+i} = \frac{-1+i+1+i}{-2} = \frac{2i}{-2} = -i$$

$$|-i| = \sqrt{0+1} = 1, \quad \varphi = \frac{3}{2}\pi,$$

tedy

$$z = 1 \cdot e^{i \cdot 3\pi/2} = \cos \frac{3}{2}\pi + i \sin \frac{3}{2}\pi.$$

b)

$$\begin{aligned} z &= \frac{a+ib}{(a+b)+(b-a)i} = \frac{(a+ib) \cdot [(a+b)+(a-b)i]}{(a+b)^2 + (b-a)^2} \\ &= \frac{a^2 + ab + b^2 - ab + i(ab + b^2 + a^2 - ab)}{2(a^2 + b^2)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \end{aligned}$$

$$\left| \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \right| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \varphi = \frac{\pi}{4},$$

tedy

$$z = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

7. Vynásobte komplexní čísla

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right), \quad b = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{2} - i \sin \frac{\pi}{2} \right).$$

Výsledek napište v algebraickém tvaru.

Řešení: Obě čísla převedeme do exponenciálního tvaru, pak je s použitím vzorce pro součin z 7.6 vynásobíme a výsledek postupně převedeme do goniometrického a algebraického tvaru:

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\pi/4}, \quad b = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = 2\sqrt{2} e^{-i\pi/2}, \\ a \cdot b &= \frac{1}{\sqrt{2}} 2\sqrt{2} e^{i\pi/4} e^{-i\pi/2} = 2e^{i(\pi/4 - \pi/2)} = 2e^{-i\pi/4}, \\ a \cdot b &= 2e^{-i\pi/4} = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} - i\sqrt{2}. \end{aligned}$$

8. Vyjádřete v algebraickém tvaru podíl $\frac{a}{b}$ komplexních čísel

$$a = 4 \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right), \quad b = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right).$$

Řešení: Postupujeme stejně jako v předcházejícím příkladu, tj. vyjádříme daná čísla v exponenciálním tvaru, potom použijeme vzorec pro podíl z 7.6 a výsledek upravíme do goniometrického a algebraického tvaru:

$$\begin{aligned} a &= 4e^{-i\pi/4}, \quad b = 2e^{i3\pi/4}, \\ \frac{a}{b} &= \frac{4e^{-i\pi/4}}{2e^{i3\pi/4}} = 2e^{i(-\pi/4 - 3\pi/4)} = 2e^{-i\pi} = 2(\cos(-\pi) + i \sin(-\pi)) = 2(-1 + i \cdot 0) = -2. \end{aligned}$$

9. Vypočtete i^{35} , i^5 , i^{42} , i^{36} .

Řešení: Při výpočtu využijeme operace násobení komplexních čísel a skutečnosti, že $i^2 = -1$, $i^4 = 1$:

$$\begin{aligned} i^{35} &= i^{32} \cdot i^3 = 1 \cdot i^3 = i^2 \cdot i = -i, & i^{42} &= i^{40} \cdot i^2 = 1 \cdot (-1) = -1, \\ i^5 &= i^4 \cdot i = 1 \cdot i = i, & i^{36} &= 1. \end{aligned}$$

10. Vypočtete $(2 - i)^4$.

Řešení: Komplexní číslo je v algebraickém tvaru, jeho mocninu vypočteme pomocí binomické věty z odst. 5.11:

$$\begin{aligned} (2 - i)^4 &= \sum_{\ell=0}^4 \binom{4}{\ell} 2^{4-\ell} (-i)^\ell = 2^4 - \binom{4}{1} 2^3 i + \binom{4}{2} 2^2 i^2 - \binom{4}{3} 2 i^3 + i^4 = \\ &= 16 - 4 \cdot 8i + 6 \cdot 4(-1) - 4 \cdot 2(-i) + 1 = -7 - 24i. \end{aligned}$$

11. Vypočtete z^6 , je-li $z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right)$.

Řešení: Přejdeme k exponenciálnímu tvaru $z = 2e^{-i\pi/4}$ a použijeme Moivreovu větu:

$$z^6 = \left(2e^{-i\pi/4} \right)^6 = 2^6 e^{-i \cdot 6\pi/4} = 64 e^{-i \cdot 3\pi/2} = 64 \left(\cos\left(-\frac{3}{2}\pi\right) + i \sin\left(-\frac{3}{2}\pi\right) \right) = 64i.$$

12. Vypočtete $(1 - i)^8$.

Řešení: Číslo $1 - i$ převedeme na exponenciální tvar podle 7.4 a 7.5 a potom použijeme Moivreovu větu:

$$\begin{aligned} |1 - i| &= \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}, \\ \cos \varphi &= \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \varphi = \frac{-1}{\sqrt{2}} \implies \varphi = -\frac{1}{4}\pi, \quad 1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}, \\ (1 - i)^8 &= \left(\sqrt{2} e^{-i\pi/4} \right)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{-i \cdot 8\pi/4} = 16 e^{-2\pi i} = 16. \end{aligned}$$

13. Určete $\sqrt[3]{z}$, je-li: a) $z = 27e^{i \cdot 2\pi/3}$, b) $z = 1 - i\sqrt{3}$.

Řešení: a) Výpočet provedeme postupem popsaným v odst. 7.7:

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{27}e^{i(2\pi/3+2k\pi/3)} = 3e^{i(2\pi/9+2k\pi/3)}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Tedy:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{z} &= 3e^{i \cdot 2\pi/9} \quad \text{pro } k = 0, \\ \sqrt[3]{z} &= 3e^{i \cdot 8\pi/9} \quad \text{pro } k = 1, \\ \sqrt[3]{z} &= 3e^{i \cdot 14\pi/9} \quad \text{pro } k = 2. \end{aligned}$$

b) Dané komplexní číslo nejprve převedeme na exponenciální tvar, viz odst. 7.4 a 7.5, a potom opět použijeme postup popsaný v odst. 7.7:

$$z = 1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\pi/3}, \quad \sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{2}e^{i(-\pi/9+2k\pi/3)}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Tedy:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{z} &= \sqrt[3]{2}e^{-i\pi/9} \quad \text{pro } k = 0, \\ \sqrt[3]{z} &= \sqrt[3]{2}e^{i \cdot 5\pi/9} \quad \text{pro } k = 1, \\ \sqrt[3]{z} &= \sqrt[3]{2}e^{i \cdot 11\pi/9} \quad \text{pro } k = 2. \end{aligned}$$

14. Vypočtěte $\sqrt[4]{1}$.

Řešení:

$$\sqrt[4]{1} = \sqrt[4]{e^{i \cdot 0}} = e^{i \cdot k\pi/2}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Tedy:

$$\sqrt[4]{1} = \begin{cases} e^{i \cdot 0 \cdot \pi} = 1 & \text{pro } k = 0, \\ e^{i\pi/2} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i & \text{pro } k = 1, \\ e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 & \text{pro } k = 2, \\ e^{i \cdot 3\pi/2} = \cos \frac{3}{2}\pi + i \sin \frac{3}{2}\pi = -i & \text{pro } k = 3. \end{cases}$$

Body komplexní roviny odpovídající těmto čtyřem hodnotám jsou podle 7.7 vrcholy čtverce vepsaného do kružnice se středem v počátku a poloměrem 1, přičemž jedním vrcholem je bod $[1, 0]$.

15. Určete $\sqrt{-8-6i}$ bez převodu na exponenciální (goniometrický) tvar.

Řešení: Odmocninu hledáme ve tvaru $x + iy$, tj. řešíme rovnici $\sqrt{-8-6i} = x + iy$. Umocněním této rovnice a porovnáním reálných a imaginárních částí levé a pravé strany takto získané rovnice dostaneme soustavu rovnic


$$x^2 - y^2 = -8, \quad 2xy = -6.$$

Za předpokladu $x \neq 0$ vyjádříme z druhé rovnice $y = -\frac{3}{x}$, dosadíme do první rovnice a dostaneme bikvadratickou rovnici

$$x^4 + 8x^2 - 9 = 0.$$

Protože rovnice $w^2 + 8w - 9 = 0$ má kořeny $w_1 = 1$, $w_2 = -9$, reálnými kořeny této rovnice jsou čísla $x_1 = 1$, $x_2 = -1$. Těmto hodnotám odpovídají hodnoty $y_1 = -3$, $y_2 = 3$. Rovnici $\sqrt{-8-6i} = x + iy$ tedy vyhovují komplexní čísla $z_1 = 1 - 3i$, $z_2 = -1 + 3i$.

16. Řešte binomickou rovnicí $z^6 = -64$. Kořeny vyjádřete v algebraickém tvaru a graficky znázorněte v Gaussově rovině.



Obr. 7.3

Řešení: Postupujeme stejně jako v příkladech 13 a 14:

$$z^6 = -64 \iff z = \sqrt[6]{-64} = \sqrt[6]{64e^{i\pi}} = 2e^{i(\pi/6+k\pi/3)}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

Dostáváme tedy šest různých hodnot:

$$\begin{aligned} k = 0: \quad z_1 &= 2e^{i\pi/6} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3} + i, \\ k = 1: \quad z_2 &= 2e^{i\pi/2} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 2i, \\ k = 2: \quad z_3 &= 2e^{i5\pi/6} = 2 \left(\cos \frac{5}{6}\pi + i \sin \frac{5}{6}\pi \right) = -\sqrt{3} + i, \\ k = 3: \quad z_4 &= 2e^{i7\pi/6} = 2 \left(\cos \frac{7}{6}\pi + i \sin \frac{7}{6}\pi \right) = -\sqrt{3} - i, \\ k = 4: \quad z_5 &= 2e^{i3\pi/2} = 2 \left(\cos \frac{3}{2}\pi + i \sin \frac{3}{2}\pi \right) = -2i, \\ k = 5: \quad z_6 &= 2e^{i11\pi/6} = 2 \left(\cos \frac{11}{6}\pi + i \sin \frac{11}{6}\pi \right) = \sqrt{3} - i. \end{aligned}$$

Kořeny $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ rovnice $z^6 = -64$ (přesněji řečeno, jejich obrazy v Gaussově rovině) tvoří vrcholy pravidelného šestiúhelníka vepsaného do kružnice se středem v počátku a poloměrem 2, jehož jeden vrchol je bod $[\sqrt{3}, 1]$ (viz obr. 7.3).

7.9. Neřešené příklady

1. Určete exponenciální tvar komplexního čísla:

a) -5 ; b) $-2i$; c) $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

$$[5e^{i\pi}; 2e^{-i\pi/2}; e^{i4\pi/3}]$$

2. Určete algebraický tvar komplexního čísla:

a) $\frac{5}{2}e^{i \cdot 3\pi/2}$; b) $e^{i\pi/3}$; c) $4e^{i\pi}$.

$$\left[-\frac{5}{2}i; \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}; -4 \right]$$

3. Vypočtete: i^{35} ; i^5 ; i^2 ; i^{42} ; i^{36} .

$$[-i; i; -1; -1; 1]$$

4. Vypočtete:

a) $(1+i)(2+i) + (1+i)(1+2i)$; b) $\frac{1+i}{1+2i}$.

$$\left[6i; \frac{3}{5} - \frac{1}{5}i \right]$$

5. Vypočtete součin čísel $z_1 = 2e^{i\pi/6}$ a $z_2 = 3e^{i \cdot 3\pi/4}$.

$$[6 \cdot e^{i \cdot 11\pi/12}]$$

6. Vypočtete podíl $\frac{z_1}{z_2}$, je-li $z_1 = 4e^{i\pi}$, $z_2 = 2e^{i\pi/6}$.

$$[2e^{i \cdot 5\pi/6}]$$

7. Pomocí binomické věty vypočtete: $(\sqrt{2} + i\sqrt{3})^5$.

$$[-11\sqrt{2} - 31\sqrt{3}i]$$

8. Pomocí Moivreovy věty vypočtete: $(1+i)^4$.

$$[-4]$$

9. Vypočtete:

a) $\sqrt[3]{-1-i}$;

$$[\sqrt[6]{2}e^{i(5\pi/12+2k\pi/3)}, k = 0, 1, 2, 3, 4, 5]$$

b) $\sqrt[6]{-1}$.

$$\left[\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{i}{2}, \pm i, -\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{i}{2} \right]$$

10. Řešte binomickou rovnicí:

a) $z^4 = 16$;

$$[z_k = 2e^{i \cdot k\pi/2}, k = 0, 1, 2, 3]$$

b) $z^6 = 1 - i$.

$$[z_k = \sqrt[12]{2}e^{i(-\pi/24+k\pi/3)}, k = 0, 1, 2, 3, 4, 5]$$