

## Kombinatorika a geometrická pravděpodobnost

1. Mějme v rovině 6 bodů, z nichž žádné tři neleží na jedné přímce. Spojíme náhodně vybrané 3 dvojice úsečkou. Jaká je pravděpodobnost, že vznikne trojúhelník, jestliže

- (a) dvojice se ve výběru mohou opakovat?  
(b) dvojice se ve výběru nemohou opakovat?

**Řešení:** Počet všech možných úseček je  $\binom{6}{2} = 15$ .

$$(a) P = \frac{15 \cdot 8 \cdot 1}{15^3} = \frac{8}{225}, \quad (b) P = \frac{15 \cdot 8 \cdot 1}{15 \cdot 14 \cdot 13} = \frac{8}{182}.$$

2. V krabici je 6 zelených a 11 žlutých míčků. Postupně vytáhneme náhodně tři z nich. Víme, že první a třetí tažený míček je žlutý. Který způsob tahu - s navrácením po každém tahu nebo bez navrácení - dá větší pravděpodobnost tohoto jevu?

**Řešení:** S navrácením: Počet všech trojic vytažených míčků je  $17^3$ . Protože na druhém místě může být buď zelený - takových trojic je  $11 \cdot 6 \cdot 11$  - nebo žlutý, takových trojic je  $11^3$ , je

$$P = \frac{11^2 \cdot 6 + 11^3}{17^3} = 0.418$$

Bez navrácení: Počet všech trojic je  $17 \cdot 16 \cdot 15$ . Počet příznivých trojic je  $11 \cdot 6 \cdot 10 + 11 \cdot 10 \cdot 9$ . Takže

$$P = \frac{11 \cdot 6 \cdot 10 + 11 \cdot 10 \cdot 9}{17 \cdot 16 \cdot 15} = 0.404.$$

3. 5 vadných tištěných spojů je zamícháno mezi 10 dobrých. Postupně je testujeme dokud neobjevíme všechny dobré spoje. Jaká je pravděpodobnost, že poslední z dobrých spojů bude objeven jako 12-tý v pořadí?

**Řešení:** Všech uspořádání 15 spojů je  $15!$ . Příznivá uspořádání vzniknou takto: Na zadané 12. místo dáme jeden z 10 dobrých spojů. Za něj na místa 13, 14 a 15 umístíme 3 vadné spoje, což lze  $5 \cdot 4 \cdot 3$  způsoby. Na zbylá místa 1 – 11 dáme zbylých 11 spojů jakkoli, což lze  $11!$  způsoby.

$$P = \frac{10 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 11!}{15!} = 0.018.$$

4. Studenti A a B jdou na zkoušku, jejíž hodnocení je 1, 2 a 3. Označíme následující jevy

$$\begin{aligned} A &= \{\text{A dostane 2}\}, \\ B &= \{\text{B dostane 2}\}, \\ C &= \{\text{žádný 1, ale aspoň jeden 2}\} \end{aligned}$$


a víme, že  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.3$  a  $P(C) = 0.4$ . Jaká je pravděpodobnost, že alespoň jeden dostane 2, ale nikdo 3?

**Řešení:** Označíme si  $D = \{\text{alespoň jeden dostane 2, ale nikdo 3}\}$ . Pak  $C \subset A \cup B$  a  $D = ((A \cup B) \setminus C) \cup (A \cap B)$ . Odtud

$$\begin{aligned} P(D) &= P((A \cup B) \setminus C) + P(A \cap B) = P(A \cup B) - P(C) + P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) - P(C) + P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(C) = 0.2. \end{aligned}$$

5. Dva přátelé  $A$  a  $B$  si domluví schůzku mezi 9.00 a 10.00. Jejich příchody na dané místo jsou náhodné v rámci smluveného časového intervalu. Každý bude čekat 10 minut a pak odchází. Jaká je pravděpodobnost, že dojde k setkání?

**Řešení:** Všechny možné časy příchodů obou přátel je množina dvojic  $(t_1, t_2)$ , kde  $t_1$  je čas příchodu osoby  $A$  a  $t_2$  čas příchodu osoby  $B$ . (Na obrázku je tato množina reprezentována celým čtvercem s čárkovaným okrajem.) Aby se oba přátelé potkali, musí se doby jejich příchodů lišit maximálně o  $1/6$  hodiny. Takové příznivé dvojice časů  $(t_1, t_2)$  jsou na obrázku vyznačeny šedivou oblastí kolem diagonály.



Tato šedivá oblast zabírá z obsahu čtverce  $11/36$ , což je hledaná pravděpodobnost.

6. Úsečku délky  $r$  rozdělíme náhodně na tři části. Jaká je pravděpodobnost, že ze vzniklých částí lze sestavit trojúhelník?

**Řešení:**  $1/4$

7. Z intervalu  $\langle 0, 1 \rangle$  vybereme postupně tři čísla  $x_1, x_2$  a  $x_3$ . Jaká je pravděpodobnost, že třetí vybrané číslo bude ležet mezi prvními dvěma?

**Řešení:** Máme šest možností, jak bude vybraná trojice čísel vypadat:

$$x_1 < x_2 < x_3$$

$$x_1 < x_3 < x_2$$

$$x_2 < x_1 < x_3$$

$$x_2 < x_3 < x_1$$

$$x_3 < x_1 < x_2$$

$$x_3 < x_2 < x_1.$$

Díky symetrii mají všechny tyto možnosti stejnou pravděpodobnost. Příznivé výběry jsou dva, druhý a čtvrtý, a proto je pravděpodobnost rovna  $1/3$ .

8. V krabici máme  $n$  bílých a  $m$  černých koulí. Postupně je taháme všechny ven (bez navrácení). Jaká je pravděpodobnost, že  $k$ -tá tažená koule je bílá?

**Řešení:** Všechny možnosti jak postupně vytáhnout  $m+n$  koulí z krabice je  $(m+n)!$ . Příznivé uspořádání vznikne tak, že na  $k$ -té místo dáme bílou kouli, což lze  $n$  způsoby. Ostatní koule doplníme libovolně  $(m+n-1)!$  způsoby.

$$P = \frac{n(m+n-1)!}{(m+n)!} = \frac{n}{m+n}.$$

9. Rozdělme  $2n$  koulí náhodně do  $n$  krabic ( $n \geq 3$ ). Jaká je pravděpodobnost, že první krabice bude obsahovat právě 6 koulí? Čemu se tato pravděpodobnost blíží, když  $n \rightarrow +\infty$ ?

**Řešení:** Všech rozdělení je  $n^{2n}$ . Příznivé uspořádání vznikne vybráním 6 koulí, což lze  $\binom{2n}{6}$  způsoby, a jejich umístěním do 1. krabice. Zbytek rozdělíme do zbylých  $n - 1$  krabic libovolně, a to lze  $(n - 1)^{2n-6}$  způsoby.

$$P = \binom{2n}{6} \frac{(n-1)^{2n-6}}{n^{2n}} \rightarrow 2^6 e^{-2} / 6!.$$

10. Rozmístíme  $2n$  koulí označených čísly  $1, 2, \dots, 2n$  po jedné náhodně do  $2n$  krabic rovněž očíslovaných  $1, 2, \dots, 2n$ . Jaká je pravděpodobnost toho, že u každé krabice bude součet jejího čísla a čísla koule uvnitř sudý? Jaká je hodnota této pravděpodobnosti při  $n \rightarrow \infty$ ?

**Řešení:** Všech rozmístění je  $(2n)!$ . Aby součet čísla koule a krabice byl sudý, musí být buď obě čísla sudá nebo obě lichá. Rozdělíme koule se sudým číslem do krabic se sudým číslem, což lze  $n!$  způsoby. Stejně po té rozdělíme  $n!$  způsoby koule s lichým číslem do krabic s lichým číslem.

$$P = \frac{(n!)^2}{(2n)!} \rightarrow 0.$$

11. Mějme  $n$  krabic a mějme  $n + k$  koulí. Všechny tyto koule rozmístíme náhodně do krabic. Jaká je pravděpodobnost toho, že první krabice zůstala prázdná? K čemu se tato hodnota blíží při  $n \rightarrow \infty$ ?

**Řešení:** Všech rozmístění je  $n^{n+k}$ . Příznivá rozmístění jsou ta, u kterých použijeme k rozmístění jen  $n - 1$  krabic.

$$P = \frac{(n-1)^{n+k}}{n^{n+k}} \rightarrow e^{-1}.$$

12.  $4n$  bílých a  $n$  černých koulí je náhodně rozmístěno do  $n$  krabic tak, že v každé krabici je právě 5 koulí. Položme

$$A = \{\text{v každé krabici jsou 4 bílé a 1 černá koule}\}.$$

a) Spočítejte  $P(A)$ .

b) Pro  $n = 5$  určete pravděpodobnost, že všechny černé koule se ocitnou v jediné krabici.

**Řešení:** a) Počet všech rozdělení  $5n$  koulí do  $n$  krabic zjistíme tak, že budeme postupně vybírat po 5 koulích a umísťovat je do krabic:

$$\binom{5n}{5} \binom{5n-5}{5} \binom{5n-10}{5} \dots \binom{5}{5} = \frac{(5n)!}{(5!)^n}.$$

Stejně vytvoříme příznivá rozdělení. Do 1. krabice dáme 4 bílé z celkového počtu  $4n$  bílých a 1 černou z  $n$  černých, což lze  $\binom{4n}{4} \binom{n}{1}$  způsoby. Do 2. krabice dáme 4 bílé z  $4n - 4$  bílých a 1 černou z  $n - 1$  černých. To lze  $\binom{4n-4}{4} \binom{n-1}{1}$  způsoby, atd. Počet příznivých rozdělení je tak

$$\binom{4n}{4} \binom{n}{1} \binom{4n-4}{4} \binom{n-1}{1} \dots \binom{4}{4} \binom{1}{1} = \frac{(4n)! n!}{(4!)^n}.$$

Takže

$$P = \frac{(5!)^n (4n)! n!}{(4!)^n (5n)!} = \frac{5^n n! (4n)!}{(5n)!}.$$

b)  $P = 20! 5! 5 / 25! = 1/10626$ .

13. Každou z  $n$  různě obarvených tyčinek rozložíme na dva díly, kratší a delší. Ze všech  $2n$  vzniklých částí utvoříme dvojice. Jaká je pravděpodobnost, že
- v každé dvojici bude jeden kratší a jeden delší díl,
  - každá dvojice bude tvořit původní tyčinku?

**Řešení:** a) Počet všech rozdělení  $2n$  částí do dvojic zjistíme tak, že budeme postupně vybírat po 2 kusech a umísťovat je do dvojic:

$$\binom{2n}{2} \binom{2n-2}{2} \binom{2n-4}{2} \cdots \binom{2}{2} = \frac{(2n)!}{2^n}.$$

Stejně vytvoříme příznivá rozdělení. Do 1. dvojice dáme 1 dlouhou z celkového počtu  $n$  dlouhých a 1 krátkou z  $n$  krátkých, což lze  $n^2$  způsoby. Do 2. dvojice dáme 1 dlouhou z  $n-1$  dlouhých a 1 krátkou z  $n-1$  krátkých, a to  $(n-1)^2$  způsoby, atd. Počet příznivých rozdělení je tak  $(n!)^2$ . Takže

$$P = \frac{2^n (n!)^2}{(2n)!}.$$

b) Zde bude jiný počet příznivých rozdělení. Do každé dvojice k libovolně vybrané dlouhé části máme přesně jednu krátkou část na doplnění. Počet příznivých rozdělení je tak  $n!$  a  $P = 2^n n! / (2n)!$ .

14. Jaká je pravděpodobnost, že mezi  $n$  náhodně zvolenými lidmi budou alespoň dva slavit narozeniny ve stejný den?

**Řešení:** Každý může mít narozeniny v jednom z 365 dní. (Uvažujeme nepřestupný rok.) Počet všech rozložení narozenin  $n$  lidí je tak  $365^n$ . Určíme pravděpodobnost jevu opačného než je v zadání úlohy, tj. zajímá nás počet takových rozložení narozenin, kdy každý z  $n$  lidí má narozeniny v jiném dni. Těch je  $365 \cdot 364 \cdot \dots \cdot (365 - (n-1))$ , (součin má  $n$  činitelů). Tedy

$$P = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdot \dots \cdot (365 - n + 1)}{365^n} = 1 - \frac{1}{365^n} \binom{365}{n} n!.$$

15. Z  $n$  párů bot vybereme  $2k$  jednotlivých kusů.

- Jaká je pravděpodobnost, že jedna mezi vybranými nebude ani jeden pár?
- Jaká je pravděpodobnost, že mezi vybranými bude přesně jeden pár?
- Jaká je pravděpodobnost, že mezi vybranými budou přesně dva páry?

**Řešení:** Všech výběrů  $2k$  kusů z  $2n$  bot je  $\binom{2n}{2k}$ .

a) Příznivý výběr získáme takto: Z  $n$  párů si napřed vybereme  $2k$  párů, a to lze  $\binom{n}{2k}$  způsoby. Pak z každého takto vybraného páru jednu botu - pravou nebo levou, což je možné dvěma způsoby. Tím počet výběrů bot, mezi kterými není žádný pár je

$$\binom{n}{2k} \overbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}^{2k} = \binom{n}{2k} 2^{2k}.$$

Hledaná pravděpodobnost je

$$P = \frac{\binom{n}{2k} 2^{2k}}{\binom{2n}{2k}}.$$

b) Zvolíme si do výběru jeden celý pár. To lze  $n$  způsoby. Zbývá vybrat z  $n - 1$  párů  $2k - 2$  bot. To je ale předchozí případ a) s  $n - 1$  místo  $n$  a  $2k - 2$  místo  $2k$ . Tedy

$$P = \frac{n \binom{n-1}{2k-2} 2^{2k-2}}{\binom{2n}{2k}}.$$

c) Zvolíme do výběru celé dva páry, což lze  $\binom{n}{2}$  způsoby. Zbývá nám  $n - 2$  párů, ze kterých volíme  $2k - 4$  bot stejně jako v případě a). Takže

$$P = \frac{\binom{n}{2} \binom{n-2}{2k-4} 2^{2k-4}}{\binom{2n}{2k}}.$$

16. Kniha o  $k$  stranách obsahuje celkově  $n$  tiskových chyb. Jaká je pravděpodobnost, že na 1. straně je  $r_1$  chyb, na 2. straně je  $r_2$  chyb, ... a na  $k$ -té straně je  $r_k$  tiskových chyb? ( $r_1 + r_2 + \dots + r_k = n$ .)

**Řešení:** Každá chyba může být na jedné z  $k$  stran. Tím je celkový počet rozmístění  $n$  chyb na  $k$  stran roven  $k^n$ . Příznivá rozdělení získáme, že na 1. stranu vybereme  $r_1$  chyb, což lze  $\binom{n}{r_1}$  způsoby. Na 2. stranu můžeme dát  $r_2$  chyb  $\binom{n-r_1}{r_2}$  způsoby atd. Počet příznivých rozmístění všech chyb je

$$\binom{n}{r_1} \binom{n-r_1}{r_2} \binom{n-r_1-r_2}{r_3} \dots \binom{n-r_1-\dots-r_{k-1}}{r_k} = \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!}.$$

Odpověď je  $P = n! / (r_1! \dots r_k! k^n)$ .

17. Uvažujme  $n$  lidí mezi nimiž jsou zahrnuti i dvě osoby  $A$  a  $B$ .

- (a) Jaká je pravděpodobnost, že při náhodném seřazení  $n$  lidí do řady bude mezi osobou  $A$  a  $B$  stát právě  $k$  lidí?  
 (b) Jaká je pravděpodobnost, že při posazení  $n$  lidí kolem kulatého stolu bude mezi  $A$  a  $B$  právě  $k$  lidí?

**Řešení:** a) Počet všech uspořádání  $n$  lidí do řady je  $n!$ . Počet způsobů, jak do řady umístit osobu  $A$ , za ní  $k$  volných míst a pak osobu  $B$  je  $n - k - 1$ . Protože  $A$  a  $B$  se mohou prohodit, vynásobíme předešlé číslo dvěma. Zbýlých  $n - 2$  osob umístíme na zbylých  $n - 2$  míst libovolně, což lze  $(n - 2)!$  způsoby.

$$P = \frac{2(n-k-1)(n-2)!}{n!} = \frac{2(n-k-1)}{n(n-1)}.$$

b) Počet rozmístění  $n$  lidí v řadě je  $n$ -krát větší než počet rozmístění  $n$  lidí kolem kulatého stolu: Máme-li osoby rozesazené kolem stolu, zvolíme jednu z nich jako první a od ní pak ostatní odpočítáváme, jako by stáli v řadě. Protože volba první osoby může být uskutečněná  $n$  způsoby, získáme z jednoho rozesazení kolem stolu  $n$  různých řad. Počet všech rozesazení  $n$  lidí kolem kulatého stolu je tak  $n! / n = (n - 1)!$ . Příznivá rozesazení získáme následovně. Osoby  $A$  a  $B$  posadíme tak, aby mezi nimi bylo  $k$  volných židlí. Zbýlých  $n - 2$  osob rozmístíme na  $n - 2$  volných míst  $(n - 2)!$  způsoby. Poslední, co musíme vzít v úvahu je fakt, že prohodíme-li osoby  $A$  a  $B$  získáme nové rozesazení. Toto ovšem platí s výjimkou

jednoho případu: Když  $k = (n - 2)/2$ , sedí  $A$  a  $B$  přesně naproti sobě a jejich prohozením nezískáváme nové rozesazení. Závěr:

$$P = \frac{2(n-2)!}{(n-1)!} = \frac{2}{n-1} \quad \text{pro } k \neq \frac{n-2}{2},$$

$$P = \frac{(n-2)!}{(n-1)!} = \frac{1}{n-1} \quad \text{pro } k = \frac{n-2}{2}.$$

18. V sadě  $n$  výrobků je 5 vadných. Vybereme náhodně  $k$  z celé sady. Jaká je pravděpodobnost, že vzorek obsahuje právě jeden vadný výrobek, jestliže

(a) výběr je bez navracení.

(b) výběr je s navracením.

**Řešení:** (a) Počet všech možných výběrů  $k$ -tic z  $n$  výrobků je  $\binom{n}{k}$ . Příznivý případ je, když v  $k$ -tici je přesně jeden vadný výrobek. Ten můžeme vybrat z 5 vadných a zbylých  $k - 1$  doplnit z  $n - 5$  výrobků bez závady. To lze  $5\binom{n-5}{k-1}$ . Výsledek je

$$P = \frac{5\binom{n-5}{k-1}}{\binom{n}{k}}.$$

(b) Počet všech možných výběrů  $k$ -tic z  $n$  výrobků s navracením je  $n^k$ . Příznivý případ je, když v  $k$ -tici je přesně jeden vadný výrobek. Ten můžeme vybrat z 5 vadných a umístíme ho na jedno z  $k$  míst ve vybrané  $k$ -tici, což lze  $5k$  způsoby. Zbylých  $k - 1$  výrobků doplníme z  $n - 5$  výrobků bez závady, což dává  $(n - 5)^{k-1}$  způsobů. Výsledek je

$$P = \frac{5k(n-5)^{k-1}}{n^k} = \frac{5k}{n} \left(1 - \frac{5}{n}\right)^{k-1}.$$

19. Mezi  $N$  míčky je  $n$  bílých a  $N - n$  modrých. Náhodně vybereme bez navracení  $K$  míčků z celkového počtu.

(a) Jaká je pravděpodobnost, že mezi vybranými bude  $k$  bílých?

(b) Jak se změní výsledek, budeme-li provádět výběr s navracením každého taženého míčku?

**Řešení:** (a) Počet všech možných výběrů  $K$ -tic z  $N$  míčků je  $\binom{N}{K}$ . Příznivý případ je, když v  $K$ -tici je přesně  $k$  bílých míčků. Ty můžeme vybrat z  $n$  bílých  $\binom{n}{k}$  způsoby a zbylých  $K - k$  doplnit z  $N - n$  modrých. To lze  $\binom{n}{k}\binom{N-n}{K-k}$  způsoby. Výsledek je

$$P = \frac{\binom{n}{k}\binom{N-n}{K-k}}{\binom{N}{K}}.$$

(b) Počet všech možných výběrů  $K$ -tic z  $N$  výrobků s navracením je  $N^K$ . Příznivý případ je, když v  $K$ -tici je přesně  $k$  bílých míčků. Ty lze vybrat z  $n$  bílých  $n^k$  způsoby a umístit je do  $K$ -tice  $\binom{K}{k}$  způsoby. Zbylých  $K - k$  míčků doplníme z  $N - n$  modrých a to  $(N - n)^{K-k}$  způsoby. Výsledek je

$$P = \frac{n^k \binom{K}{k} (N-n)^{K-k}}{N^K} = \binom{K}{k} \left(\frac{n}{N}\right)^k \left(1 - \frac{n}{N}\right)^{K-k}.$$

Jiný způsob výpočtu je, když si uvědomíme, že se jedná o Bernoulliho schéma s  $K$  pokusy vybírání míček do  $K$ -tice, kde úspěch je výběr bílého míčku. Pravděpodobnost úspěchu je  $n/N$  a tedy pravděpodobnost  $k$  úspěchů z  $K$  pokusů je daná

$$P = \binom{K}{k} \left(\frac{n}{N}\right)^k \left(1 - \frac{n}{N}\right)^{K-k}.$$

20. Nezkušený zaměstnanec vybírá vzorek o  $n$  kusech tak, že si zapíše číslo náhodně zvoleného kusu a kus opět vrátí do zásobníku obsahujícího celkově  $N$  kusů. Jaká je pravděpodobnost, že jeho seznam obsahuje alespoň dvě duplicitní položky?

**Řešení:** Uvažujme jev opačný, tj. seznam obsahuje navzájem různé položky. Počet všech možných zápisů délky  $n$ , kde položky mohou být brány z  $N$  možností je  $N^n$ . Chceme-li, aby všechny položky byly navzájem různé, zvolíme si  $n$  různých položek z celkového počtu  $N$ , což lze  $\binom{N}{n}$  způsoby. Tyto položky pak mohou být na seznamu v různých pořadích a to dává dalších  $n!$  možností. Celkově

$$P = 1 - \binom{N}{n} \frac{n!}{N^n}.$$

21.  $A$  hodí 3 krát mincí, u níž je pravděpodobnost, že padne panna  $p_A$ .  $B$  hodí dvakrát mincí, u které je pravděpodobnost panny  $p_B$ .  $A$  vyhraje, pokud mu padne větší počet pannen. Jinak vyhrává  $B$ .

- (a) Jaká je pravděpodobnost, že vyhraje  $A$ ?  
 (b) Ukažte, že hra je spravedlivá, pokud jsou mince symetrické.

**Řešení:** (a) Vítězství hráče  $A$  nastane v každém z následujících tří případů. Buď hráči  $A$  padnou tři panny (pak na hráči  $B$  nezáleží), což má pravděpodobnost  $p_A^3$ . Nebo  $A$  hodí dvakrát pannu a jednou orla, což má pravděpodobnost  $3p_A^2(1-p_A)$ , a v tom případě nesmí mít  $B$  dvakrát pannu,  $1-p_B^2$ . Pravděpodobnost tohoto případu je tak  $3p_A^2(1-p_A)(1-p_B^2)$ . Zbývá poslední možnost, že  $A$  hodí jen jednu pannu a dvakrát orla,  $3p_A(1-p_A)^2$ , a  $B$  jenom dvakrát orla,  $(1-p_B)^2$ , což má celkově pravděpodobnost  $3p_A(1-p_A)^2(1-p_B)^2$ . Sečtením všech tří případů dostaneme

$$P = p_A^3 + 3p_A^2(1-p_A)(1-p_B^2) + 3p_A(1-p_A)^2(1-p_B)^2.$$

- (b) Pro symetrické mince je  $p_A = p_B = 1/2$  a výsledek případu (a) je  $P = 1/2$ .

22. Do  $n$  očíslovaných krabic náhodně rozmístíme  $n$  očíslovaných míčeků.

- (a) Jaká je pravděpodobnost, že žádná krabice nebude prázdná?  
 (b) Jaká je pravděpodobnost, že přesně jedna krabice bude prázdná?  
 (c) Rozmístíme nyní  $n+1$  míčeků. Jaká je pravděpodobnost, že přesně jedna krabice bude prázdná?  
 (d) Rozmístíme nyní  $n+2$  míčeků. Jaká je pravděpodobnost, že alespoň jedna krabice bude prázdná?

**Řešení:** (a) Počet všech možných rozmístění je  $n^n$ . Příznivá jsou ta rozmístění, kdy v každé krabici je jen jeden míček a těch je  $n!$ . Takže  $P = n!/n^n$ .

(b) Při tomto rozmístění musí být jedna krabice prázdná, jedna krabice obsahující dva míčky a zbylých  $n-2$  krabic má po jednom míčku. Počet těchto rozdělení získáme tak, že si zvolíme krabici, která bude prázdná ( $n$  možností), a která bude obsahovat dva míčky ( $(n-1)$  možností). Do této krabice vybereme z  $n$  míčeků

dva, což lze  $\binom{n}{2}$  způsoby a zbylých  $(n-2)$  míčků rozdělíme po jednom do zbylých  $(n-2)$  krabic  $(n-2)!$  způsoby. Celkově

$$P = \frac{n(n-1)\binom{n}{2}(n-2)!}{n^n} = \binom{n}{2} \frac{n!}{n^n}.$$

(c) Počet všech rozmístění je  $n^{n+1}$ . Příznivá rozložení jsou dvojího typu. Buď existuje krabice se třemi míčky a  $(n-2)$  krabic má po jednom míčku nebo existují dvě krabice po dvou míčkách a  $(n-3)$  krabic po jednom míčku. Rozložení prvního typu získáme, že si zvolíme krabici, která bude prázdná ( $n$  způsoby) a krabici se třemi míčky ( $(n-1)$  způsoby). Do té vybereme tři míčky z  $(n+1)$ , což lze  $\binom{n+1}{3}$  způsoby. Do zbylých  $(n-2)$  krabic rozdělíme míčky po jednom a to  $(n-2)!$  možnostmi. Celkově máme

$$n(n-1)\binom{n+1}{3}(n-2)! = \binom{n+1}{3}n!$$

rozdělení prvního typu. Pro druhý typ postupujeme podobně. Zvolíme krabici, která bude prázdná ( $n$  možností) a dvě krabice, které budou obsahovat po dvou míčkách ( $\binom{n-1}{2}$  možností). Do první krabice, která má obsahovat dva míčky dáme dva míčky z  $(n+1)$ , což lze  $\binom{n+1}{2}$  způsoby. Další dva míčky ze zbylých ( $\binom{n-1}{2}$  možností) dáme do druhé připravené krabice. Nakonec nám zůstalo  $(n-3)$  míčků, které rozdělíme do  $(n-3)$  krabic  $(n-3)!$  způsoby. Takže počet rozmístění druhého typu je

$$n\binom{n-1}{2}\binom{n+1}{2}\binom{n-1}{2}(n-3)! = \frac{n}{4}\binom{n-1}{2}(n+1)!.$$

Pravděpodobnost, že přesně jedna krabice zůstane prázdná je tak

$$P = \frac{1}{n^{n+1}} \left( \binom{n+1}{3}n! + \frac{n}{4}\binom{n-1}{2}(n+1)! \right).$$

(d) Budeme uvažovat jev opačný, tj. že žádná krabice nezůstala prázdná. Počet všech rozmístění je zde  $n^{n+2}$ . Příznivá rozložení jsou dvojího typu. Buď existuje krabice se třemi míčky a  $(n-1)$  krabic má po jednom míčku nebo existují dvě krabice po dvou míčkách a  $(n-2)$  krabic po jednom míčku. Rozložení prvního typu získáme, že si zvolíme krabici, která bude obsahovat tři míčky ( $n$  způsoby). Do té vybereme tři míčky z  $(n+2)$ , což lze  $\binom{n+2}{3}$  způsoby. Do zbylých  $(n-1)$  krabic rozdělíme míčky po jednom a to  $(n-1)!$  možnostmi. Celkově máme

$$n\binom{n+2}{3}(n-1)! = \binom{n+2}{3}n!$$

možností. Pro druhý typ postupujeme podobně. Zvolíme dvě krabice, které budou obsahovat po dvou míčkách ( $\binom{n}{2}$  možností). Do první z nich dáme dva míčky z  $(n+2)$ , což lze  $\binom{n+2}{2}$  způsoby. Další dva míčky ze zbylých ( $\binom{n}{2}$  možností) dáme do druhé připravené krabice. Nakonec nám zůstalo  $(n-2)$  míčků, které rozdělíme do  $(n-2)$  krabic  $(n-2)!$  způsoby. Takže počet rozmístění druhého typu je

$$\binom{n}{2}\binom{n+2}{2}\binom{n}{2}(n-2)! = \binom{n}{2} \frac{(n+2)!}{4}.$$

Celkově máme pro hledanou pravděpodobnost  $P$

$$P = 1 - \frac{1}{n^{n+2}} \left( \binom{n+2}{3}n! + \binom{n}{2} \frac{(n+2)!}{4} \right).$$



23. Do  $N$  očíslovaných krabic se náhodně rozdělí  $n$  očíslovaných míčků. Jaká je pravděpodobnost, že v  $K$ -té krabici bude  $k$  míčků?

**Řešení:** Pokud si povšimneme, že se jedná o Bernoulliho schéma, kde pokus je umístění míčku do jedné z  $N$  krabic a úspěch je umístění míčku přesně do  $K$ -té krabice (pravděpodobnost úspěchu je tedy  $1/N$ ), pak podle vzorce pro pravděpodobnost  $k$  úspěchů v sérii  $n$  pokusů máme

$$P = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{N}\right)^k \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{n-k}.$$

Jiné řešení: Počet všech možných umístění  $n$  míčků do  $N$  krabic je  $N^n$ . Příznivé rozložení dostaneme, že vezmeme  $k$  míčků z celkového počtu  $n$  (což, lze  $\binom{n}{k}$  způsoby) a dáme je do  $K$ -té krabice. Zbýlých  $(n - k)$  míčků rozdělíme libovolně do zbýlých  $(N - 1)$  krabic a to  $(N - 1)^{n-k}$  způsoby. Celkově

$$P = \frac{\binom{n}{k} (N - 1)^{n-k}}{N^n} = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{N}\right)^k \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{n-k}.$$

24. Ve městě žije  $n + 1$  obyvatel. Jeden z občanů začne šířit fámu a to tak, že ji sdělí náhodně vybranému obyvateli. Ten ji opět sdělí dalšímu náhodně vybranému obyvateli (může to být i ten, od koho se ji dozvěděl). Tak se fáma šíří městem.

- (a) Jaká je pravděpodobnost, že fáma bude  $k$  krát předána, aniž by se vrátila k původci?  
 (b) Jaká je pravděpodobnost, že fáma bude  $k$  krát předána, aniž by se vrátila k někomu, kdo ji už slyšel?

Jak se změní výsledek, když místo jednoho obyvatele si v každém kroku může osoba předávající fámu vybrat náhodně  $r$  posluchačů?

**Řešení:** (a) Počet všech způsobů, jak se fáma může šířit během  $k$  kroků je  $n^k$ , neboť v každém kroku může být sdělena jednomu z  $n$  obyvatel. Příznivé šíření fámy je takové, že z dalších kroků je vyloučen její původce: v 1. kroku ji předá jednomu z  $n$  obyvatel a v dalších  $(k - 1)$  krocích je pouze  $(n - 1)$  možností komu ji předat, neboť původce je nyní vyloučen. Počet příznivých šíření je  $n(n - 1)^{k-1}$ . Celkově

$$P = \frac{n(n - 1)^{k-1}}{n^k} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{k-1}.$$

(b) Počet všech způsobů šíření je stejný jako v případě (a), tj.  $n^k$ . Příznivá šíření: v 1. kroku máme na výběr z  $n$  obyvatel. Ve 2. kroku už jen  $(n - 1)$  obyvatel neboť kdo fámu již slyšel je vyloučen z další účasti na šíření, ... atd, a v posledním  $k$ -tém kroku je pouze  $(n - k + 1)$  obyvatel, kteří fámu ještě neslyšeli. Výsledná pravděpodobnost je

$$P = \frac{n(n - 1) \cdots (n - k + 1)}{n^k} = \binom{n}{k} \frac{k!}{n^k}.$$

Pro  $r$ : (a)  $\frac{\binom{n-1}{r} r^{r^2+\dots+r^{k-1}}}{\binom{n}{r} r^{r+r^2+\dots+r^{k-1}}}$ , (b)  $\frac{\prod_{j=1}^{k-1} \prod_{i=1}^{r^j} \binom{n-ir-r^2-\dots-r^j}{r}}{\binom{n}{r} r^{r+r^2+\dots+r^{k-1}}}$ .

25. Tři hráči  $A$ ,  $B$  a  $C$  hrají karty způsobem, že vždy dva se účastní hry a třetí stojí mimo. Kdo ve hře prohraje, je nahrazen tím, který nehrál. Tento systém pokračuje tak dlouho, dokud jeden z hráčů nevyhraje dvakrát za sebou. Pak se stává celkovým vítězem. Všichni hráči jsou v kartách stejně dobří. Začínají hrát hráči  $A$  a  $B$ .

- (a) Jaké jsou pravděpodobnosti celkového vítězství pro  $A$ ,  $B$  a  $C$ ?  
 (b) Jaká je pravděpodobnost, že hra skončí nejpozději v  $k$ -tém kole?

Jak se změní řešení, předpokládáme-li, že  $A$  a  $B$  jsou stejně dobří, ale nad hráčem  $C$  oba vyhrávají s pravděpodobností  $p$ ?

**Řešení:** a) Průběh hry budeme značit posloupností výherců v jednotlivých kolech. Např.  $ACBB$  označuje hru skládající se ze čtyř kol, v prvním vyhrál  $A$ , který pak hrál s hráčem  $C$  a vyhrál hráč  $C$ . Pak  $C$  hrál s  $B$  a vyhrál  $B$  a nakonec hrál  $B$  opět s  $A$  a vyhrál znovu  $B$ . Tím byla série her ukončena.

Jsou dva typy serií, kdy vyhraje hráč  $A$ :

- (a)  $ACBACB \cdots ACBAA$ , kde se skupina  $ACB$  opakuje  $k$  krát,  $k = 0, 1, \dots$ ;  
 (b)  $BCA BCA \cdots BCAA$ , kde se skupina  $BCA$  opakuje  $k$  krát,  $k = 1, 2, \dots$

Výsledná pravděpodobnost se spočte sečtením pravděpodobností všech uvedených případů.

$$P(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{8}\right)^k \frac{1}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{8}\right)^k \frac{1}{2} = \frac{2}{7} + \frac{1}{14} = \frac{5}{14}.$$

Ze symetrie  $P(A) = P(B) = 5/14$  a doplňková pravděpodobnost je  $P(C) = 4/14$ . Pro obecnější případ si stačí uvědomit, že pravděpodobnost skupiny  $ACB$  i  $BCA$  je rovna  $\frac{1}{2}(1-p)p$ . Pak

$$P(A) = P(B) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}(1-p)p\right)^k \frac{1}{2} p + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}(1-p)p\right)^k \frac{1}{2} = \frac{p}{2} \frac{3-p}{2-p+p^2}.$$

b) Nejkratší série jsou dvě  $AA$  a  $BB$  a tato série má pravděpodobnost  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ . Pro tři kola máme dvě série  $ACC$  a  $BCC$  a pravděpodobnost  $\frac{1}{8} + \frac{1}{8}$ , pro čtyři opět dvě série  $ACBB$  a  $BCAA$  a příslušnou pravděpodobnost  $\frac{1}{16} + \frac{1}{16}$ , atd. Má-li série přesně  $k \geq 2$  kol, má tedy pravděpodobnost  $2^{-k+1}$ . Sečtením těchto pravděpodobností dostaneme odpověď

$$P = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdots + \frac{1}{2^{k-1}} = 1 - \frac{1}{2^{k-1}}.$$

V obecném případě je jednodušší spočítat pravděpodobnost jevu opačného. Výsledek závisí na tvaru čísla  $k$ :

$$\begin{aligned} P &= 1 - 2 \left(\frac{1}{2}(1-p)p\right)^i && \text{pro } k = 3i, \\ P &= 1 - \left(\frac{1}{2}(1-p)p\right)^i && \text{pro } k = 3i + 1, \\ P &= 1 - (p-1) \left(\frac{1}{2}(1-p)p\right)^i && \text{pro } k = 3i + 2. \end{aligned}$$

26. Mějme minci, u níž je pravděpodobnost panny rovna  $p \in \langle 0, 1 \rangle$  a orla  $1-p$ . Házíme tak dlouho, dokud nepadne za sebou dvakrát totéž.

- (a) Jaká je pravděpodobnost, že série hodů skončí nejpozději v šestém hodu?  
 (b) Jaká je pravděpodobnost, že série bude mít sudý počet hodů?

**Řešení:** (a) Uvažujme opačný jev, tj. série má minimálně 6 hodů. Aby tomu tak bylo nesmí za sebou padnout dvakrát totéž, takže máme jen dva možné případy:  $OPOPOP$  nebo  $POPOPO$ . Oba dva mají stejnou pravděpodobnost  $p^3(1-p)^3$ . Takže

$$P = 1 - 2p^3(1-p)^3.$$

(b) Má-li mít série sudý počet hodů, pak poslední dva hody jsou buď  $PP$  nebo  $OO$ . V předchozích hodech se pak musí střídát  $P$  a  $O$  a to tak, že jsou jen dvě možnosti jak série může vypadat: buď  $POPO\dots POPP$  nebo  $OPOP\dots OPOO$ . Je-li délka série  $2n$ , pak první z nich má pravděpodobnost  $p^{n+1}(1-p)^{n-1}$  a druhá  $p^{n-1}(1-p)^{n+1}$ . Takže

$$\begin{aligned} P &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( p^{n+1}(1-p)^{n-1} + p^{n-1}(1-p)^{n+1} \right) \\ &= p^2 \sum_{n=1}^{\infty} (p(1-p))^{n-1} + (1-p)^2 \sum_{n=1}^{\infty} (p(1-p))^{n-1} \\ &= \frac{p^2}{1-p(1-p)} + \frac{(1-p)^2}{1-p(1-p)} = \frac{p^2 + (1-p)^2}{1-p(1-p)}. \end{aligned}$$

27. V krabici jsou bílé a černé koule. Provedeme dvakrát náhodný výběr, přičemž po každém tahu kouli opět vrátíme do krabice. Označme

$$A = \{\text{obě tažené koule jsou téže barvy}\}.$$

a) Ukažte, že  $P(A) \geq \frac{1}{2}$ .

b) Spočítejte  $P(A)$  v případě, že bychom tažené koule do krabice nevraceli. Platí i v tomto případě, že  $P(A) \geq \frac{1}{2}$ ?

**Řešení:** (a) Označme si počet bílých koulí jako  $n$  a černých  $m$ . Pak

$$P(A) = \frac{m^2 + n^2}{(m+n)^2}.$$

Protože pro libovolná  $m, n$  platí  $2mn \leq m^2 + n^2$ , je  $P(A) \geq \frac{1}{2}$ . Pro případ (b) je pravděpodobnost

$$P(A) = \frac{m(m-1) + n(n-1)}{(m+n)(m+n-1)}$$

a to je např. pro  $m = n = 2$  rovno  $1/3$ .

28. Do  $k$  krabic rozmístíme náhodně  $n$  míčků.

(a) Jaká je pravděpodobnost, že poslední krabice zůstala prázdná?

(b) Jaká je pravděpodobnost, že nějaký míček se dostal do první nebo do poslední krabice?

**Řešení:** Každý míček má  $k$  možností, kam ho lze umístit. Proto počet všech možných rozmístění je  $k^n$ .

(a) Máme-li zakázánu poslední krabici, je počet možností, jak umístit míček  $k-1$ , a tedy

$$P = \frac{(k-1)^n}{k^n}.$$

(b) Podíváme se na opačný jev, tj. že první a poslední krabice zůstaly prázdné. V tom případě máme jen  $k-2$  možností, kam umístit míčky, a tak

$$P = 1 - \frac{(k-2)^n}{k^n}.$$

29. Ve skladovacím boxu je  $n$  monočlánků, mezi nimiž je zamícháno  $k$  vybitých monočlánků,  $k < n$ . Postupně je vybíráme z boxu bez navrácení a testujeme, je-li monočlánek vybitý či nikoli.

- Jaká je pravděpodobnost, že poslední vytažený monočlánek bude nevybitý?
- Jaká je pravděpodobnost, že poslední nevybitý monočlánek vytahneme jako třetí od konce?

**Řešení:** (a) Výsledek jedné série vytahování monočlánků si můžeme zapsat jako posloupnost  $n$  symbolů, např.  $NVV \dots NN$ , kde  $V$  označuje vybitý monočlánek a  $N$  monočlánek nabitý. Počet symbolů  $V$  je  $k$  a počet symbolů  $N$  je  $n - k$ . Všech takových  $n$ -tic je  $\binom{n}{k}$ . Příznivý výběr je, když  $n$ -tice končí symbolem  $N$ . Takové uspořádání dostaneme, že na poslední místo v  $n$ -tici dáme  $N$  a ze zbylých  $n - 1$  míst vybereme  $\binom{n-1}{k}$  způsoby  $k$ -tice, které obsadíme symboly  $V$ . Takže

$$P = \frac{\binom{n-1}{k}}{\binom{n}{k}} = \frac{n-k}{n}.$$

(b) Příznivý výběr je v tomto případě  $n$ -tice zakončená  $\dots NVV$ . Do prvních  $n - 3$  neobsazených míst můžeme umístit  $\binom{n-3}{k-2}$  způsoby  $k - 2$  symbolů  $V$ . Odtud máme

$$P = \frac{\binom{n-3}{k-2}}{\binom{n}{k}} = \frac{k(k-1)(n-k)}{n(n-1)(n-2)}.$$

### Podmíněná pravděpodobnost

- Hodíme dvěma kostkami, červenou a zelenou. Označíme  $A$  jev „na červené padla 3, 4 nebo 5“,  $B$  jev „na zelené padla 1 nebo 2“,  $C$  jev „součet bodů je 7“. Ukažte, že jevy  $A, B, C$  jsou nezávislé.
- Hodíme tři kostky. Jaká je pravděpodobnost, že padla alespoň jedna šestka, víme-li, že padla navzájem různá čísla?

**Řešení:** Položíme  $A = \{\text{alespoň jedna } 6\}$  a  $B = \{\text{navzájem různá čísla}\}$ . Pak  $P(B) = 6 \cdot 5 \cdot 4 / 6^3$  a  $P(A \cap B) = 3 \cdot 5 \cdot 4 / 6^3$ , takže

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{2}.$$

- Předpokládáme, že narození chlapce nebo děvčete má stejnou pravděpodobnost. Jaká je pravděpodobnost, že v rodině se dvěma dětmi jsou oba chlapci, víme-li, že

- alespoň jedno z dětí je chlapec.
- první dítě je chlapec.

**Řešení:** (a) Položíme  $A = \{\text{oba chlapci}\}$  a  $B = \{\text{alespň jeden chlapec}\}$ . Pak  $P(B) = 1 - 1/4 = 3/4$  a  $P(A \cap B) = P(A) = 1/4$ . Takže  $P(A|B) = 1/3$ .

(b) Zde bude jev  $B = \{\text{první dítě je chlapec}\}$ . Pak  $P(B) = 1/2$  a  $P(A \cap B) = P(A) = 1/4$ . Tím  $P(A|B) = 1/2$ .

- Zásilka 24 produktů obsahuje 13 vadných. Je rozdělena do dvou stejných skupin.
  - Jaká je pravděpodobnost, že jedna skupina obsahuje jen vadné produkty?

- (b) Produkty jsou rozděleny tak, že jedna skupina se skládá ze samých vadných výrobků. Náhodně zvolíme skupinu a produkt z ní. Je vadný. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně zvolený produkt z druhé skupiny bude také vadný?

**Řešení:** (a) Počet všech rozdělení 24 produktů do dvou stejných skupin je  $\binom{24}{12}$ . Příznivá rozdělení dostaneme, že buď do první nebo do druhé skupiny vybíráme pouze z 13-ti vadných produktů, což je  $2\binom{13}{12}$  způsobů. Takže

$$P = \frac{2\binom{13}{12}}{\binom{24}{12}}.$$

- (b) Budeme potřebovat následující jevy:

$$\begin{aligned} C &= \{\text{náhodně zvolená skupina obsahuje jen vadné produkty}\}, \\ B &= \{\text{produkt zvolený z náhodně vybrané skupiny je vadný}\}, \\ A &= \{\text{produkt zvolený z druhé skupiny je vadný}\}. \end{aligned}$$

V tomto označení máme zjistit  $P(A|B)$ . Pro výpočet  $P(A \cap B)$  a  $P(B)$  musíme použít vzorec pro úplnou pravděpodobnost.

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|C)P(C) + P(B|\bar{C})P(\bar{C}) = 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{2} = \frac{13}{24}, \\ P(A \cap B) &= P(A \cap B|C)P(C) + P(A \cap B|\bar{C})P(\bar{C}) = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

Odtud

$$P(A|B) = \frac{2}{13}.$$

5. V krabici je jeden míček barvy bílé nebo černé. Přidáme k němu jeden bílý míček a pak z krabice náhodně jeden míček vytahneme. Je bílý. Jaká je pravděpodobnost, že na počátku byl míček v krabici také bílý?

**Řešení:** Položíme  $A = \{\text{původní míček je bílý}\}$  a  $B = \{\text{tažený míček je bílý}\}$ . Chceme vypočítat  $P(A|B)$ . Víme, že  $P(B|A) = 1$ ,  $P(B|\bar{A}) = 1/2$  a  $P(A) = 1/2$ . Podle Bayeseva vzorce dostaneme

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})} = \frac{2}{3}.$$

6. Házíme kostkou tak dlouho dokud nepadne šestka.

- (a) Nepadla-li šestka při prvním hození, jaká je pravděpodobnost, že nepadne ani při dalších dvou?  
 (b) Víme-li, že počet potřebných hodů byl sudý, jaká je pravděpodobnost, že byl roven dvěma?

**Řešení:** (a) Protože hody jsou nezávislé (a tedy výsledek prvního hození nemá vliv na další hody) je pravděpodobnost rovna

$$P = \frac{5}{6} \frac{5}{6} = \frac{25}{36}.$$

- (b) Položíme  $A = \{\text{počet hodů je 2}\}$  a  $B = \{\text{počet hodů je sudý}\}$ . Chceme vypočítat  $P(A|B)$ .

$$P(A \cap B) = P(A) = \frac{5}{6} \frac{1}{6} = \frac{5}{36}.$$

Zbývá zjistit  $P(B)$ . Musíme sečíst pravděpodobnosti, že šestka padla poprvé ve druhém hození, ve čtvrtém hození, v šestém hození, ... atd. Tedy

$$P(B) = \frac{5}{6} \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^5 \frac{1}{6} + \dots = \frac{5}{11}.$$

Odtud dostaneme výsledek  $P(A|B) = 11/36$ .

7. V koši je  $n$  bílých a  $m$  černých míčků. Náhodně vytáhneme jeden. Vratíme ho zpět a přidáme do koše  $k$  míčků téže barvy, jakou měl tažený míček. Tento postup opakujeme. Jaká je pravděpodobnost, že při  $j$ -tém tahu vytáhneme bílý míček?

**Řešení:** Vyřešíme případ pro  $j = 2$ . Označíme si

$$A = \{\text{tažený míček v 1. tahu je bílý}\}$$

$$B = \{\text{tažený míček ve 2. tahu je bílý}\}.$$

Chceme vypočítat  $P(B)$ . Za zadání známe následující pravděpodobnosti:

$$P(B|A) = (n+k)/(m+n+k), \quad P(A) = n/(m+n),$$

$$P(B|\bar{A}) = n/(m+n+k), \quad P(\bar{A}) = m/(m+n).$$

Podle vzorce o úplné pravděpodobnosti dostaneme

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})$$

$$= \frac{n+k}{m+n+k} \frac{n}{m+n} + \frac{n}{m+n+k} \frac{m}{m+n} = \frac{n}{m+n}.$$

Protože po provedení tahu jsou pravděpodobnosti vytažení bílého či černého míčku stejné jako na počátku, výsledek se opakováním taků nemění a odpověď je, že při  $j$ -tém tahu je pravděpodobnost vytažení bílého míčku  $n/(m+n)$ .

8. Stroj má 2 komponenty  $A$  a  $B$ , které fungují nezávisle na sobě. Stroj pracuje, jsou-li obě komponenty funkční. Víme, že  $A$  má spolehlivost 98% a stroj má spolehlivost 95%. Jakou spolehlivost má komponenta  $B$ ?

**Řešení:** Je-li  $A$ , resp.  $B$  označují jevy, že komponenty  $A$ , resp.  $B$  jsou funkční, pak máme, že  $P(A) = 0.98$  a  $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.95$ . Odtud  $P(B) = 0.97$ .

9. Máme  $n$  bílých a  $n$  černých míčků. Jak je máme rozdělit do dvou krabic, aby při náhodné volbě krabice a vytažení náhodného míčku z této krabice byla pravděpodobnost, že míček je bílý maximální?

**Řešení:** [1 bílý, 0 černých], [( $n-1$ ) bílých,  $n$  černých].

10. Házíme  $n$  krát mincí, kde pravděpodobnost panny je  $p$ .

- (a) Jaká je pravděpodobnost, že ve čtvrtém hození padla panna, víme-li, že v celé sérii padlo  $k$  panen?
- (b) Označíme jevy  $A = \{\text{v prvním hození padla panna}\}$  a  $B_k = \{\text{v sérii padlo } k \text{ panen}\}$ . Pro jaké hodnoty  $k$  jsou jevy  $A$  a  $B_k$  nezávislé?

**Řešení:** a)  $k/n$ , b)  $k = pn$ .

11. Házíme nesymetrickou mincí s pravděpodobností panny rovnou  $p$  tak dlouho, dokud nám nepadne panna.

- (a) Nepadla-li panna v prvních dvou hozeních, jaká je pravděpodobnost, že nepadne ani v následujících třech hozeních?

- (b) Víme-li, že potřebný počet hodů byl lichý, jaká je pravděpodobnost, že byl roven třem?

**Řešení:** a)  $(1 - p)^3$ , b)  $(1 - p)^2 p(2 - p)$

12. V souboru  $n$  mincí je jedna mající na obou stranách pannu. Ostatní mince jsou správné. Náhodně zvolíme minci a šestkrát s ní hodíme. Pokaždé padla panna. Jaká je pravděpodobnost, že tato mince má znak panny na obou stranách?

**Řešení:**  $2^6 / (2^6 + n - 1)$ .

13. V každé ze dvou krabic se nacházejí dvě mince. V první krabici jsou to mince u nichž je pravděpodobnost, že padne panna rovna  $p_1$  a ve druhé krabici mince, kde pravděpodobnost panny je  $p_2$ ,  $p_1 \neq p_2$ . Máme na výběr dva postupy:

- (a) Náhodně zvolíme krabici a hodíme oběma mincemi, které se v ní nachází.  
 (b) Z každé krabice náhodně vybereme po jedné minci a hodíme s nimi.

Výhra nám přináleží, padne-li na obou mincích panna. Který postup je výhodnější?

**Řešení:** a)  $(p_1^2 + p_2^2)/2$ , b)  $p_1 p_2$ . Postup a) je výhodnější.

14. Vzácna mince spadla do jednoho z  $n$  kontejnerů se šrotem. Pravděpodobnost, že zapadla do  $i$ -tého kontejneru je  $p_i$ ,  $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$ . Je-li mince v  $i$ -tém kontejneru a hledáme-li ji tam, pak ji nalezneme s pravděpodobností  $q_i$ . Jaká je pravděpodobnost, že mince je v  $i$ -tém kontejneru, když jsme ji nenašli v  $j$ -tém kontejneru?

**Řešení:**  $p_i / (1 - p_j q_j)$  pro  $i \neq j$  a  $(1 - q_i) p_i / (1 - p_i q_i)$  pro  $i = j$ .

15. Osoby  $A$ ,  $B$  a  $C$  lžou s pravděpodobností  $p$  a mluví pravdu s pravděpodobností  $1 - p$  a to nezávisle na sobě. Osoba  $C$  pronesla jistý výrok. Jaká je pravděpodobnost, že nebyl pravdivý, víme-li, že osoba  $A$  prohlásila: „ $B$  mi sdělil, že  $C$  lhal.“

**Řešení:**  $(p^2 + (1 - p)^2) / (3p^2 + (1 - p)^2)$ .

16. Máme tři krabice  $K_1$ ,  $K_2$  a  $K_3$ . Složení krabice  $K_i$  je  $n_i$  bílých míčků a  $m_i$  černých míčků,  $i = 1, 2, 3$ .

- (a) Z náhodně zvolené krabice vytáhneme dva míčky. Jsou bílý a černý. Jaká je pravděpodobnost, že byly taženy z krabice  $K_i$ ,  $i = 1, 2, 3$ ?  
 (b) Z krabice  $K_1$  přendáme náhodně jeden míček do  $K_2$  a pak opět jeden míček zpět do  $K_1$ . Jaká je pravděpodobnost, že složení  $K_1$  a  $K_2$  zůstali stejné?  
 (c) Z krabice  $K_1$  přendáme náhodně jeden míček do  $K_2$ , z  $K_2$  jeden míček do  $K_3$  a pak z  $K_3$  jeden míček zpět do  $K_1$ . Jaká je pravděpodobnost, že složení všech krabic zůstane stejné?

**Řešení:** (a)  $\frac{n_i m_i}{\binom{n_i + m_i}{2}} / \sum_{j=1}^3 \frac{n_j m_j}{\binom{n_j + m_j}{2}}$ , (b)  $\frac{n_1(n_2 + 1) + m_1(m_2 + 1)}{(n_1 + m_1)(n_2 + m_2 + 1)}$ ,

(c)  $\frac{n_1(n_2 + 1)(n_3 + 1) + m_1(m_2 + 1)(m_3 + 1)}{(n_1 + m_1)(n_2 + m_2 + 1)(n_3 + m_3 + 1)}$ .

17. Krabice obsahuje lístečky očíslované  $1, \dots, n$ . Náhodně vytáhneme jeden. Má-li číslo 1, necháme si ho. Jinak ho vrátíme do krabice. Vytáhneme další lístek. Jaká je pravděpodobnost, že má číslo 2?

**Řešení:**  $\frac{1}{n} \left( \frac{1}{n-1} + \frac{n-1}{n} \right)$ .

18. Máme 16 zlatých mincí, z nichž 7 je pouze na povrchu pozlacených, zbylé jsou pravé. Mince rozdělíme do dvou stejně velkých skupin.

- (a) Jaká je pravděpodobnost, že jedna ze skupin bude obsahovat pouze pravé mince?
- (b) Předpokládejme, že mince jsou rozděleny tak, že jedna ze skupin obsahuje pouze pravé mince. Z náhodně zvolené skupiny vybereme minci. Je pravá. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraná mince z druhé skupiny je rovněž pravá?

**Řešení:** a)  $2 \binom{9}{8} / \binom{16}{8} = 0.0014$ , b)  $2/9$

### Distribuční funkce

1. V intervalu  $\langle 0, 1 \rangle$  zvolíme náhodně bod  $A$ . Označíme-li  $X$  vzdálenost bodu  $A$  od bližšího konce intervalu, určete distribuční funkci  $F_X$  a hustotu  $f_X$  náhodné veličiny  $X$ .

**Řešení:**

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < 0; \\ 2t & t \in \langle 0, 1/2 \rangle; \\ 1 & t > 1/2. \end{cases} \quad f_X(t) = \begin{cases} 0 & t \notin \langle 0, 1/2 \rangle; \\ 2 & t \in \langle 0, 1/2 \rangle. \end{cases}$$

2. Hráči  $A$  a  $B$  hází šipky na kruhový terč s poloměrem  $r$ . Náhodné veličiny  $L_A$  a  $L_B$  budou označovat vzdálenost šipky hozené hráčem  $A$  a  $B$  od středu terče. Známe jejich distribuční funkce

$$F_{L_A}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0; \\ \sqrt{t/r} & t \in \langle 0, r \rangle; \\ 1 & t > r. \end{cases} \quad F_{L_B}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0; \\ t^2/r^2 & t \in \langle 0, r \rangle; \\ 1 & t > r. \end{cases}$$

Který z hráčů je lepší?

**Řešení:** Lepší je ten z hráčů, který má větší pravděpodobnost umístění šipky blíže středu terče. Porovnáním hustot (tj. derivací funkcí  $F_{L_A}$  a  $F_{L_B}$ ) zjistíme, že lepší je  $A$ .

3. Ve čtverci  $\langle 0, 1 \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$  zvolíme náhodně bod  $A$ . Označíme  $T$  trojúhelník s vrcholy  $[0, 0]$ ,  $[1, 0]$  a  $A$ . Bude-li  $X$  znamenat obsah trojúhelníka  $T$ , určete distribuční funkci  $F_X$  a hustotu  $f_X$  náhodné veličiny  $X$ .

**Řešení:**

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < 0; \\ 2t & t \in \langle 0, 1/2 \rangle; \\ 1 & t > 1/2. \end{cases} \quad f_X(t) = \begin{cases} 0 & t \notin \langle 0, 1/2 \rangle; \\ 2 & t \in \langle 0, 1/2 \rangle. \end{cases}$$

4. Cestující přišel na zastávku autobusu právě, když autobus odjel. Je rozhodnut čekat 5 minut a pak odchází. Interval mezi příjezdy autobusů jsou náhodné v rozmezí 4 – 6 minut. Je-li  $X$  doba, po kterou cestující čeká na zastávce, nalezněte distribuční funkci  $F_X$ .

**Řešení:** Náhodná veličina  $X$  nabývá hodnot v intervalu  $\langle 4, 5 \rangle$ . Je-li  $t \in \langle 4, 5 \rangle$ , pak pravděpodobnost jevu ( $X \leq t$ ) je stejná jako pravděpodobnost, že autobus přijede v časovém intervalu  $\langle 4, t \rangle$  od doby odjezdu předchozího spoje. Tato pravděpodobnost je rovna  $(t - 4)/2$ . Takže

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < 4; \\ (t - 4)/2 & t \in \langle 4, 5 \rangle; \\ 1 & t \geq 5. \end{cases}$$



5. Na trh je dán nový model přístroje. Průzkum ukázal, že přístroj by mohl být velmi úspěšný s pravděpodobností 0.6, středně úspěšný s pravděpodobností 0.3 a neúspěšný s pravděpodobností 0.1. Roční zisk spojený s případem „velmi úspěšný“ je 15 miliónů, v případě „úspěšný“ je 5 miliónů a v případě „neúspěšný“ je ztráta 0.5 miliónů. Je-li  $X$  roční zisk, nalezněte distribuční funkci  $F_X$ .

**Řešení:**  $X$  nabývá hodnot  $-0.5$ ,  $5$  a  $15$  miliónů. Odtud dostaneme

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < -0.5; \\ 0.1 & t \in \langle -0.5, 5 \rangle; \\ 0.4 & t \in \langle 5, 15 \rangle; \\ 1 & t \geq 15. \end{cases}$$

6. (Obtížné) Ve čtverci  $\langle 0, 1 \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$  zvolíme náhodně bod  $A$ . Označíme-li  $X$  vzdálenost bodu  $A$  od nejbližšího vrcholu čtverce, určete distribuční funkci  $F_X$  a hustotu  $f_X$  náhodné veličiny  $X$ .

**Řešení:**

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < 0; \\ \pi t^2 & t \in \langle 0, \frac{1}{2} \rangle; \\ \pi t^2 + 2\sqrt{t^2 - \frac{1}{4}} - 4t^2 \arcsin \frac{\sqrt{t^2 - \frac{1}{4}}}{t} & t \in (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\sqrt{2}); \\ 1 & t > \frac{1}{2}\sqrt{2}. \end{cases}$$

$$f_X(t) = \begin{cases} 2\pi t & t \in \langle 0, \frac{1}{2} \rangle; \\ 2\pi t - 8t \arcsin \frac{\sqrt{t^2 - \frac{1}{4}}}{t} & t \in (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\sqrt{2}); \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

### Střední hodnota

1. Ruleta má 37 polí očíslovaných  $0, 1, 2, \dots, 36$ . Lze vsadit buď nějaké na číslo mezi 1 a 36 a v tom případě se vyhrává 36 násobek vsazené částky. Nebo lze vsadit na barvu červenou či černou (sudá políčka jsou červená a lichá jsou černá, nula je zelená, na ní se nesází) a v tom případě se vyhrává dvojnásobek vsazené částky. Jaká je v obou případech průměrná výhra?

**Řešení:** Náhodná veličina  $X$  bude mít význam zisku.

- (a) Sázka na barvu:  $X$  má hodnoty při vsazené jednotkové částce 1 (výhra) nebo  $-1$  (prohra). Tím  $EX = 1 \cdot \frac{18}{37} - 1 \cdot \frac{19}{37} = -\frac{1}{37}$ .
- (b) Sázka na číslo:  $X$  má hodnoty 35 (výhra) nebo  $-1$  (prohra).  $EX = 35 \cdot \frac{1}{37} - 1 \cdot \frac{36}{37} = -\frac{1}{37}$ .

2. Pro  $n$  náhodně zvolených lidí určete průměrný počet dnů v roce, v nichž má právě  $k$  z nich narozeniny. Jaký je průměrný počet dnů, v nichž mají alespoň dva lidé narozeniny?

**Řešení:**  $X$  značí počet dnů v roce, kdy má přesně  $k$  lidí narozeniny. Napíšeme si  $X$  ve tvaru  $X = X_1 + \dots + X_{365}$ , kde náhodné veličiny  $X_i$  nabývají hodnoty 1, má-li v  $i$ -tý den právě  $k$  lidí narozeniny nebo 0, když tomu tak není. Pak  $EX = EX_1 + \dots + EX_{365}$ . Pravděpodobnost, že v pevně zvolený  $i$ -tý den má právě  $k$  lidí narozeniny je

$$P_i = \binom{n}{k} \frac{364^{n-k}}{365^n}.$$

Odtud dostaneme  $EX_i = 1 \cdot P_i$  a celkově

$$EX = 365 \cdot \binom{n}{k} \frac{364^{n-k}}{365^n} = \binom{n}{k} \frac{364^{n-k}}{365^{n-1}}.$$

Druhou otázku zodpovíme tím, že od celkového počtu dní v roce odečteme průměrný počet dní, kdy nemá žádný z  $n$  lidí narozeniny a počet dní, kdy má právě jeden člověk narozeniny. Tyto dva údaje získáme z výše vypočteného vzorce pro  $k = 0$  a  $k = 1$ , což dává  $365 - \frac{364^n}{365^{n-1}} - n \frac{364^{n-1}}{365^{n-1}}$ .

3. Jistá královská dynastie má následující pravidlo týkající se počtu dětí: Královský pár má mít děti dokud se nenarodí syn nebo dokud nejsou maximálně tři. Jaký je průměrný počet dětí v takové královské rodině, když pravděpodobnost narození dcery nebo syna je stejná?

**Řešení:** Položíme  $X$  náhodnou veličinu označující počet dětí v královské rodině. Její možné hodnoty jsou  $X = 0, 1, 2, 3$ . Dále,  $P(X = 1) = 1/2$ . Jev  $X = 2$  znamená, že první se narodila dcera a pak syn, což dává  $P(X = 2) = 1/4$ . Zbývá jev  $X = 3$ , který znamená buď tři dcery nebo dvě dcery a nejmladší dítě je syn. Oba mají pravděpodobnost  $1/8$ , takže  $P(X = 3) = 1/4$ . Tím

$$EX = 0P(X = 0) + 1P(X = 1) + 2P(X = 2) + 3P(X = 3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = 1.75.$$

4. Hodíme dvakrát kostkou. Jaká je průměrná hodnota maximálního z obou výsledků?

**Řešení:** Označíme  $X$  maximum z obou výsledků. Pak  $P(X = k) = \frac{2k-1}{36}$ , pro  $k = 1, \dots, 6$ . Odtud dostaneme  $E(X) = \sum_{k=1}^6 kP(X = k) = 161/36$ .

5. Házíme nesymetrickou mincí, kde pravděpodobnost panny je  $p$  a orla  $1 - p$ . Jaká je průměrný počet hodů, než dojde k přerušení série stejných výsledků?

**Řešení:** Náhodná veličina  $X$  označuje počet hodů až po přerušení série stejných výsledků. Její hodnoty jsou  $X = 2, 3, \dots$ . Jev  $(X = k)$  znamená, že buď padala série  $k - 1$  panen a v  $k$ -tém hodu padl orel nebo serii  $k - 1$  orlů nakonec přerušila v  $k$ -tém hodu panna. Tím  $P(X = k) = p^{k-1}(1 - p) + (1 - p)^{k-1}p$  a

$$E(X) = \sum_{k=2}^{\infty} k(p^{k-1}(1 - p) + (1 - p)^{k-1}p) = \frac{1}{1 - p} + \frac{1}{p} - 1.$$

6. V kapse máme  $n$  různých klíčů, z nichž pouze jeden je správný klíč ke dveřím, které chceme odemknout. Klíče náhodně taháme z kapsy a zkoušíme. Jaký je průměrný počet pokusů než se nám podaří dveře odemknout, když

- (a) použité klíče nevracíme zpět do kapsy,  
(b) použité klíče vracíme zpět do kapsy?

**Řešení:**  $X$  bude označovat počet pokusů.

(a) V tomto případě je  $X = 1, \dots, n$ . Jev  $(X = k)$  si lze představit tak, že vyložíme všech  $n$  klíčů do řady a na  $k$ -tém místě bude ležet ten správný. Všech uspořádání  $n$  klíčů do řady je  $n!$  a těch se správným klíčem na  $k$ -tém místě je  $(n - 1)!$ . Takže  $P(X = k) = 1/n$ . Odtud

$$E(X) = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} = \frac{n+1}{2}.$$

(b) Zde  $X = 1, 2, \dots$ . Aby nastal ( $X = k$ ), museli jsem  $(k - 1)$ -krát tahnout nesprávný klíč a v posledním  $k$ -tém tahu klíč správný. Proto  $P(X = k) = \left(\frac{n-1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n}$ . Tím

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{n-1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n} = n.$$

7. V krabici je  $n$  bílých a  $m$  černých míčků. Náhodně vytáhneme  $k$  z nich ven bez navrácení. Jaký je průměrný počet bílých míčků ve vzorku?

**Řešení:** S  $i$ -tým bílým míčkem spojíme náhodnou veličinu  $X_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , takových, že  $X_i = 1$ , pokud byl  $i$ -tý míček vybrán do vzorku a  $X_i = 0$  jinak. Pak počet bílých míčků ve vzorku je  $X = X_1 + \dots + X_n$ . Dále

$$E(X_i = 1) = P(X_i = 1) = \frac{\binom{n+m-1}{k-1}}{\binom{n+m}{k}} = \frac{k}{m+n}.$$

Odtud plyne, že  $E(X) = E(X_1) + \dots + E(X_n) = nk/(m+n)$ .

8. Z intervalu  $\langle 0, 1 \rangle$  vybereme náhodně a nezávisle na sobě dvě čísla  $X_1$  a  $X_2$ .

- Jaká je průměrná hodnota většího z čísel  $X_1$  a  $X_2$ ?
- Jaká je průměrná hodnota vzdálenosti čísel  $X_1$  a  $X_2$ ?
- Jaká je průměrná hodnota druhé mocniny vzdálenosti bodu  $(X_1, X_2) \in \mathbb{R}^2$  od počátku?
- Jaká je průměrná hodnota vzdálenosti bodu  $(X_1, X_2) \in \mathbb{R}^2$  od počátku? (Použijte polární souřadnice.)

**Řešení:** (a) Položíme  $X = \max\{X_1, X_2\}$ . Pak distribuční funkce  $F_X(t) = t^2$  a hustota  $f_X(t) = 2t$ . Odtud  $E(X) = \int_0^1 t f_X(t) dt = 2/3$ .

(b) Podobně pro  $X = |X_1 - X_2|$  dostaneme  $F_X(t) = 1 - (1-t)^2$  a  $f_X(t) = 2(1-t)$ . Tím  $E(X) = 1/3$ .

(c) Zde hustota vektoru  $\mathbb{X} = (X_1, X_2)$  je  $f_{\mathbb{X}}(s, t) = 1$  pro  $(s, t) \in \langle 0, 1 \rangle^2$  a  $f_{\mathbb{X}}(s, t) = 0$  jinak. Odtud

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (s^2 + t^2) f_{\mathbb{X}}(s, t) ds dt = \int_0^1 \int_0^1 (s^2 + t^2) ds dt = \frac{2}{3}.$$

(d) Hustota  $f_{\mathbb{X}}$  je stejná jako v bodě (c). Takže s využitím polárních souřadnic dostaneme

$$E(X) = \int_0^1 \int_0^1 \sqrt{s^2 + t^2} ds dt = 2 \int_0^{\pi/4} \int_0^{1/\cos \phi} \rho^2 d\rho d\phi = \frac{1}{3}(\sqrt{2} + \ln \tan(3\pi/8)).$$

9. Společnost přepravuje nákladními auty zboží mezi městy  $A$  a  $B$  vzdálenými 1000 km. Vozy mají stejnou pravděpodobnost poruchy v jakémkoli místě trasy mezi  $A$  a  $B$ . Do jakého místa mezi  $A$  a  $B$  má firma umístit servisní stanici, aby průměrná vzdálenost od stanice do místa poruchy byla minimální, když hustota pravděpodobnosti místa poruchy je  $f(t) = 2t/10^6$ ,  $x \in \langle 0, 1000 \rangle$ ?

**Řešení:** Označíme symboly  $X$  a  $S$  vzdálenosti místa poruchy a polohy servisní stanice od města  $A$ . Dále položíme  $Y = |X - S|$ . Nejprve vypočteme  $E(Y)$ .

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^{1000} |t - S| f(t) dt = \int_0^S (S - t) f(t) dt + \int_S^{1000} (t - S) f(t) dt \\ &= \frac{2}{3} 10^{-6} S^3 - S + \frac{2}{3} 10^3. \end{aligned}$$

Minimum této funkce je rovno  $1000/\sqrt{2}$ , což je hledaná vzdálenost servisní stanice od  $A$ .


10. Stojíme na břehu přímé řeky. Náhodně zvolíme směr od řeky a jdeme tímto směrem 1 km do bodu  $Q$ .

- (a) Jaká je naše průměrná vzdálenost od řeky?  
 (b) Z bodu  $Q$  se dále vydáme náhodně jakýmkoli směrem a opět jdeme 1 km. Jaká je pravděpodobnost, že dosáhneme řeky dříve než ujdeme 1 km?

**Řešení:** (a) Vyjdeme-li od řeky pod náhodným úhlem  $\alpha \in \langle 0, \pi \rangle$ , pak vzdálenost po 1 km je  $d = 1 \cdot \sin \alpha$ . Tím

$$Ed = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin \alpha \, d\alpha = \frac{2}{\pi}.$$

(b) Poloha v tomto případě je určena dvěma náhodnými úhly  $\alpha$  a  $\beta$ , viz obrázek.



Úhel  $\beta \in \langle 0, 2\pi \rangle$  a ze symetrie se můžeme pro úhel  $\alpha$  omezit na  $\alpha \in \langle 0, \frac{1}{2}\pi \rangle$ . Náhodný výběr dvojice úhlů  $(\alpha, \beta) \in \langle 0, \frac{1}{2}\pi \rangle \times \langle 0, 2\pi \rangle$  odpovídá jednomu pokusu. Máme-li zadaný úhel  $\alpha$ , pak příznivé volby pro  $\beta$ , kdy dosáhneme břehu řeky dříve než ujdeme 1 km, jsou  $\beta \in \langle \pi + \alpha, 2\pi - \alpha \rangle$ . Tato množina zabírá v obdélníku  $\langle 0, \frac{1}{2}\pi \rangle \times \langle 0, 2\pi \rangle$  jednu čtvrtinu, takže výsledek je  $1/4$ .

11. Životnost páru armádních bot má normální rozdělení se střední hodnotou 12 měsíců a směrodatnou odchylkou  $\sigma = 2$ . Je vydáno 10 000 párů. Kolik párů bude v průměru zapotřebí vyměnit po uplynutí 15 měsíců?

**Řešení:** Označíme  $Z$  životnost bot. Pak  $Z$  má rozdělení  $N(\mu, \sigma^2)$  s  $\mu = 12$  a  $\sigma = 2$ . Položíme  $X_i = 1$ , je-li třeba  $i$ -tý pár bot vyměnit po 15 měsících a  $X_i = 0$  jinak. Pak počet párů, které bude třeba vyměnit je  $X = \sum_{i=1}^{10000} X_i$ . Protože  $E(X_i) = P(Z \leq 15) = 0.9332$ , dostáváme, že  $E(X) = 10000 \cdot 0.9332 = 9332$ .

12. Uvažujme v rovině trojúhelník  $T$ , jehož vrcholy jsou tvořeny body  $(0, 1)$ ,  $(0, 0)$  a  $(1, 0)$ . V trojúhelníku zvolíme náhodně bod  $(X, Y)$ , přičemž všechny volby jsou stejně pravděpodobné. Jaká je průměrná hodnota  $X$ -ové souřadnice bodu  $(X, Y)$ ?

**Řešení:** Označíme  $\mathbb{X} = (X, Y)$ . Hustota  $f(s, t)$  náhodného vektoru  $\mathbb{X}$  je rovna 2 v bodech  $T$  a 0 jinde. Takže

$$E(X) = \iint_T sf(s, t) \, dt ds = 2 \int_0^1 \int_0^{1-s} s \, dt ds = \frac{1}{3}.$$

13. V jednotkovém čtverci zvolíme náhodně bod  $(X, Y)$ , přičemž všechny volby jsou stejně pravděpodobné. Jaká je průměrná vzdálenost bodu  $(X, Y)$  od diagonály čtverce?

**Řešení:** Vzdálenost bodu  $(X, Y)$  od diagonály je  $L = |X - Y|/\sqrt{2}$ . Pak

$$E(L) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{|s-t|}{\sqrt{2}} \, ds dt = \int_0^1 \left( \int_0^t (t-s) \, ds + \int_t^1 (s-t) \, ds \right) dt = \frac{\sqrt{2}}{6}.$$

## Centrální limitní věta

1. Hodíme 420 krát hrací kostkou a výsledky hodů sčítáme. Pomocí centrální limitní věty odhadněte pravděpodobnost, že součet bude ležet mezi čísly 1400 a 1550.

**Řešení:** Součet si označíme  $S_{420} = X_1 + X_2 + \dots + X_{420}$ , kde  $X_i = 1$  je hodnota výsledku  $i$ -tého hodu.  $E(X_i) = 3.5$  a  $D(X_i) = 2.916$ , tj.  $\sigma = 1.708$ . Standardizovaný součet  $S_{420}^*$  pak splňuje  $-70/(\sigma\sqrt{420}) \leq S_{420}^* \leq 80/(\sigma\sqrt{420})$ , a tím dostaneme

$$P(1400 \leq S_{420} \leq 1550) = P(-2 \leq S_{420}^* \leq 2.285) = \Phi(2.285) - \Phi(-2) = 0.965.$$

2. Průměrná váha bedny je  $\mu = 50$  kg a řídí se normálním rozdělením se směrodatnou odchylkou  $\sigma = 5$ . Kolik beden je možné naložit na nákladní auto s nosností 1 tuna, abychom s pravděpodobností 99% nepřesáhli dovolenou nosnost?

**Řešení:**  $n = 18.98$  tj. maximálně 18.

3. Bod konající náhodnou procházku po ose  $x$  začíná v bodě 0 a pohybuje se tak, že se po každé vteřině posune o jedničku doprava s pravděpodobností  $1/2$  nebo o jedničku doleva rovněž s pravděpodobností  $1/2$ . Pomocí centrální limitní věty odhadněte pravděpodobnost, že bod bude po 100 krocích vzdálen od počátku nejvýše o 10.

**Řešení:** Poloha po 100 krocích je  $S_{100} = X_1 + \dots + x_{100}$ , kde  $X_i = \pm 1$ . Pak  $E(X_i) = 0$  a  $D(X_i) = 1$ . Jev  $|S_{100}| \leq 10$  má ve standardizovaném součtu tvar  $|S_{100}^*| \leq 1$ . Takže

$$P(|S_{100}^*| \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.682.$$

4. Životnost kryptonového zářiče má normální rozdělení se střední hodnotou  $\mu = 160$  hodin. Požadavky zákazníka jsou: životnost mezi 120 – 200 hodin s pravděpodobností 95%.

- (a) Jaká musí být směrodatná odchylka, aby se požadavku zákazníka vyhovělo?
- (b) Je-li směrodatná odchylka rovna hodnotě zjištěné v předchozí otázce, jaká je pravděpodobnost, že průměr životností dvou na sobě nezávislých zářičů bude v limitu 120 – 200 hodin?

**Řešení:** Označíme  $X$  životnost zářiče. Pak  $E(X) = \mu = 160$  a  $D(X) = \sigma^2$  pro hledané  $\sigma$ . Podmínka  $120 \leq X \leq 200$  se pro standartizovanou veličinu  $X^*$  změni na  $|X^*| \leq 40/\sigma$ . Pak

$$0.95 \leq P(|X^*| \leq 40/\sigma) = \Phi(40/\sigma) - \Phi(-40/\sigma) = 2\Phi(40/\sigma) - 1.$$

Z tabulky máme  $40/\sigma \leq 1.96$ , tj.  $\sigma \leq 20.4$ .

Jsou-li  $X_1$  a  $X_2$  životnosti nezávislých zářičů, pak náhodná veličina  $Z = (X_1 + X_2)/2$  má normální rozdělení se střední hodnotou 160 a rozptylem  $20.4^2/2 = 208.1$ . Podmínka  $120 \leq Z \leq 200$  se pro standartizovanou veličinu  $Z^*$  změni na  $|Z^*| \leq 2.77$ . To má pravděpodobnost  $\Phi(-2.77) + \Phi(2.77) = 2\Phi(2.77) - 1 = 0.994$ .

5. Obsah smogových částic v ovzduší v dané lokalitě je pravidelně monitorován. Přípustný limit je 7.7. Předpokládejme, že skutečný obsah smogových částic se řídí normálním rozdělením se střední hodnotou  $\mu = 7.6$  a směrodatnou odchylkou  $\sigma = 0.04$ . Měřicí přístroj je zatížen nepřesností, která má normální rozdělení s  $\mu = 0$  a  $\sigma = 0.03$ .

- (a) Jaká je pravděpodobnost, že výsledek měření nepřesáhne 7.7?

- (b) Jaká je pravděpodobnost, že průměr tří po sobě jdoucích nezávislých měření nepřesáhne 7.7?

**Řešení:** Označíme  $X_1$  skutečný obsah částic v ovzduší a  $X_2$  chybu měřícího přístroje. Pak naměřená hodnota je náhodná veličina  $Y = X_1 + X_2$ , která má normální rozdělení se střední hodnotou 7.6+0 a rozptylem  $0.04^2 + 0.03^2 = 0.0025$ . Podmínka  $Y \leq 7.7$  se pro standartizovanou veličinu  $Y^*$  změní na  $Y^* \leq 2$ . To má pravděpodobnost  $\Phi(2) = 0.977$ .

Jsou-li  $Y_1, Y_2$  a  $Y_3$  tři nezávislá měření, pak náhodná veličina  $Z = (Y_1 + Y_2 + Y_3)/3$  má normální rozdělení se střední hodnotou 7.6 a rozptylem  $0.0025/3 = 0.00083$ . Podmínka  $Z \leq 7.7$  se pro standartizovanou veličinu  $Z^*$  změní na  $Z^* \leq 3.46$ . To má pravděpodobnost  $\Phi(3.46) = 0.9997$ .

6. Házíme  $n$ -krát hrací kostkou. Pomocí centrální limitní věty zjistěte, kolik je minimálně třeba provést hodů, máme-li s pravděpodobností 98% tvrdit, že počet dvojek padlých v  $n$  hodech leží v intervalu

$$\left\langle \frac{n}{12}, \frac{n}{4} \right\rangle ?$$

**Řešení:** Položíme  $X_i = 1$  padla-li v  $i$ -tém hodu dvojka a  $X_i = 0$  jinak. Pak  $\mu = E(X_i) = 1/6$  a  $\sigma^2 = D(X_i) = 5/36$  a počet dvojek v  $n$  hodech je  $X_1 + \dots + X_n$ . Standardizovaný součet  $S_n^*$  splňuje  $|S_n^*| \leq \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{5}} = 0.223\sqrt{n}$ , a tím dostaneme

$$0.98 \leq P(|S_n^*| \leq 0.223\sqrt{n}) = \Phi(0.223\sqrt{n}) - \Phi(-0.223\sqrt{n}) = 2\Phi(0.223\sqrt{n}) - 1,$$

což z tabulky dává  $0.223\sqrt{n} \geq 2.33$ , tj.  $n \geq 110$ .

7. Cena jedné akcie Pivovaru je v  $n$ -tý den roku rovna  $Y_n$ . Akcionář Albert zjistil, že rozdíly  $X_n = Y_{n+1} - Y_n$  se chovají jako nezávislé náhodné veličiny se střední hodnotou  $\mu = 0$  a rozptylem  $\sigma^2 = 1/4$ . Má-li akcie v 1. den roku hodnotu  $Y_1 = 100$ , určete pomocí centrální limitní věty pravděpodobnost, že  $Y_{365} \geq 110$ . (Návod: vyjádřete  $Y_{365} - Y_1$  pomocí  $X_n$ .)

**Řešení:** Označíme  $S_{364} := X_1 + \dots + x_{364} = Y_{365} - Y_1 = Y_{365} - 100$ . Podmínka  $Y_{365} \geq 110$  je ekvivalentní s  $S_{364} \geq 10$ . Pro standartizovaný součet  $S_{364}^*$  to znamená, že má být větší než  $10/(\frac{1}{2}\sqrt{364}) = 1.05$ . Hledáme tak pravděpodobnost jevu

$$P(S_{364} \geq 10) = P(S_{364}^* \geq 1.05) = 1 - \Phi(1.05) = 1 - 0.853 = 0.147.$$

8. Měření vzdálenosti Jupitera a jeho měsíce Kalista je díky neovlivnitelným chybovým faktorům náhodná veličina, jejíž střední hodnota  $\mu$  je skutečná vzdálenost a rozptyl  $\sigma^2 = 16$ . Kolik měření musíme provést, abychom s pravděpodobností 96% mohli tvrdit, že aritmetický průměr naměřených hodnot se od skutečné vzdálenosti liší nejvýše o 1.5 jednotek.

**Řešení:** Výsledek  $k$ -tého měření označme  $X_k$ . Je to náhodná veličina s  $E(X_k) = \mu$  a  $D(X_k) = 16$ . Položíme  $S_n = X_1 + \dots + x_n$ . Podmínka, která má být splněna je

$$0.96 \leq P\left(\left|\frac{1}{n} S_n - \mu\right| < 1.5\right).$$

Pro standartizovaný součet  $S_n^*$  to znamená

$$0.96 \leq P(|S_n^*| < 1.5\sqrt{n}/\sigma) = P(|S_n^*| < 0.375\sqrt{n}) = \Phi(0.375\sqrt{n}) - \Phi(-0.375\sqrt{n}) = 2\Phi(0.375\sqrt{n}) - 1$$

Z tabulky dostaneme  $0.375\sqrt{n} \geq 2.05$ , tj.  $n \geq 30$ .

9. Házíme  $n$ -krát symetrickou mincí. Pomocí centrální limitní věty zjistěte, kolik je minimálně třeba provést hodů, máme-li s pravděpodobností 99% tvrdit, že počet  $S_n$  pannen padlých v  $n$  hodech je alespoň  $4/5$  počtu orlů.

**Řešení:** Podmínku  $S_n \geq \frac{4}{5}(n - S_n)$  převedeme na podmínku pro standardizovaný součet  $S_n^*$ . Protože  $S_n = X_1 + \dots + X_n$ , kde

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{je-li v } k\text{-tém hodu panna} \\ 0 & \text{jinak,} \end{cases}$$

je  $\mu = E(X) = 1/2$  a  $\sigma^2 = D(X) = 1/4$ . Podmínka  $S_n \geq \frac{4}{5}(n - S_n)$  je ekvivalentní s  $S_n \geq 4n/9$  a pro  $S_n^*$  má tvar  $S^* \geq -\frac{1}{9}\sqrt{n}$ . Pak

$$0.99 \leq P(S^* \geq -\frac{1}{9}\sqrt{n}) = 1 - \Phi(-\frac{1}{9}\sqrt{n}) = \Phi(\frac{1}{9}\sqrt{n}).$$

Z tabulky dostaneme, že  $\frac{1}{9}\sqrt{n} \geq 2.33$ , tj.  $n \geq 440$ .